

UNIVERSITÄTSKLINIKUM HAMBURG-EPPENDORF

Klinik und Poliklinik für Gynäkologie

Prof. Dr. med. Barbara Schmalfeldt

**Die funktionelle Bedeutung von Desmocollin 2 für die Entstehung
von Gehirnmetastasen beim Mammakarzinom**

Dissertation

zur Erlangung des Grades eines Doktors der Medizin
an der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg

vorgelegt von:

Judith Francesca Sophie Reimer
aus Kiel

Hamburg 2023

(wird von der Medizinischen Fakultät ausgefüllt)

**Angenommen von der
Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg am: 30.09.2024**

**Veröffentlicht mit Genehmigung der
Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg.**

Prüfungsausschuss, der/die Vorsitzende: PD Dr. Jakob Matschke

Prüfungsausschuss, zweite/r Gutachter/in: Prof. Dr. Leticia Oliveira-Ferrer

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	5
1. Publikation - Originalarbeit	6
2. Zusammenfassende Darstellung der Arbeit	23
2.1. Einleitung.....	23
2.2. Zielsetzung der Arbeit.....	27
2.3. Methodik.....	27
2.3.1. Kultivierte Zelllinien, stabile Transfektion und Versuche im 2D-Modell	27
2.3.2. Multizelluläre Tumorsphäroide und Dissoziationsversuch.....	28
2.3.3. Immunhistochemische Färbungen und Chemosensitivität im 3D-Modell	29
2.3.4. Statistische Auswertung	30
2.4. Ergebnisse und Diskussion	30
2.4.1. DSC2-Überexpression und DSC2- Knockdown in TNBC Zelllinien.....	30
2.4.2. Zellkulturexperimente im 2D-Modell	31
2.4.3. Zellkulturexperimente im 3D-Modell	32
2.4.3.1. Zellverhalten im 3D-Modell.....	32
2.4.3.2. Chemosensitivität im 3D-Modell	34
2.4.4. Weitere Versuche	37
2.5. Fazit.....	38
3. Zusammenfassung der gesamten Arbeit: Deutsch	39
4. Zusammenfassung der gesamten Arbeit: Englisch.....	41
5. Literaturverzeichnis	43
6. Erklärung des Eigenanteils an der Publikation.....	47
7. Danksagung	48
8. Lebenslauf.....	49

9. Eidesstattliche Versicherung	50
---------------------------------------	----

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schematischer Aufbau der Desmosomen.....	26
Abbildung 2: Einfluss der Desmocollin 2 (DSC2)-Expression auf den Zellverband im 3D-Modell.....	33
Abbildung 3: Einfluss der Desmocollin 2 (DSC2)-Expression auf die Chemosensitivität im 3D-Modell.....	36

1. Publikation - Originalarbeit

Reimer et al. *Cancer Cell International* (2023) 23:47
<https://doi.org/10.1186/s12935-023-02896-9>

Cancer Cell International

RESEARCH

Open Access



The role of the desmosomal protein desmocollin 2 in tumour progression in triple negative breast cancer patients

Francesca Reimer^{1†}, Sarah Bryan^{1†}, Karen Legler¹, Thomas Karn², Serenella Eppenberger-Castori³, Jakob Matschke⁴, Thais Pereira-Veiga⁵, Harriet Wikman⁵, Isabell Witzel¹, Volkmar Müller¹, Barbara Schmalfeldt¹, Karin Milde-Langosch¹, Udo Schumacher^{5,6}, Christine Stürken^{5,6,7†} and Leticia Oliveira-Ferrer^{1*†}

Abstract

Background The disruption of epithelial features represents a critical step during breast cancer spread. In this context, the dysregulation of desmosomal proteins has been associated with malignant progression and metastasis formation. Curiously, both tumour suppressive and pro-metastatic roles have been attributed to desmosomal structures in different cancer entities. In the present study, we describe the pro-metastatic role of the desmosomal protein desmocollin 2 (DSC2) in breast cancer.

Methods We analysed the prognostic role of DSC2 at mRNA and protein level using microarray data, western blot analysis and immunohistochemistry. Functional consequences of DSC2 overexpression and DSC2 knock down were investigated in the triple negative breast cancer (TNBC) cell line MDA-MB-231 and its brain-seeking subline MDA-MB-231-BR, respectively in vitro and in vivo.

Results We found a significantly higher DSC2 expression in the more aggressive molecular subtypes HER2-positive and TNBC than in luminal breast cancers, as well as a significant correlation between increased DSC2 expression and a shorter disease-free—also in multivariate analysis—and overall survival. Additionally, a significant association between DSC2 expression in the primary tumour and an increased frequency of cerebral and lung metastasis could be observed. In vitro, ectopic DSC2 expression or DSC2 down-regulation in MDA-MB-231 and MDA-MB-231-BR led to a significant tumour cell aggregation increase and decrease, respectively. Furthermore, tumour cells displaying higher DSC2 levels showed increased chemoresistance in 3D structures, but not 2D monolayer structures, suggesting the importance of cell aggregation as a means for reduced drug diffusion. In an in vivo brain dissemination xenograft mouse model, reduced expression of DSC2 in the brain-seeking TNBC cells led to a decreased amount of circulating tumour cells/clusters and, in turn, to fewer and smaller brain metastatic lesions.

Conclusion We conclude that high DSC2 expression in primary TNBC is associated with a poorer prognosis, firstly by increasing tumour cell aggregation, secondly by reducing the diffusion and effectiveness of chemotherapeutic

[†]Francesca Reimer and Sarah Bryan shared first authorship

[‡]Christine Stürken and Leticia Oliveira-Ferrer shared last authorship

*Correspondence:
Leticia Oliveira-Ferrer
ferrer@uke.de

Full list of author information is available at the end of the article



© The Author(s) 2023. **Open Access** This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver (<http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated in a credit line to the data.

agents, and, lastly, by promoting the circulation and survival of tumour cell clusters, each of which facilitates distant organ colonisation.

Keywords DSC2, Desmosome, CTC cluster, Breast cancer, Brain metastasis, Pulmonary metastasis

Background

Breast cancer is the most common malignancy among women and the leading cause of cancer-related death in women globally, with more than 90% of mortalities associated with stage IV metastatic breast cancer [1]. Breast cancer commonly metastasises to bone marrow, lung, liver, lymph nodes and brain tissue [2]. Four molecular subtypes, namely luminal A, luminal B, HER2-positive and triple-negative breast cancer (TNBC), have been associated with different patterns of metastatic spread; bone metastases with luminal A and B subtypes, liver metastases with HER2-positive subtype, and brain and lung metastases with TNBC and HER2-positive subtypes [3–5].

Metastases develop when malignant cells lose their connection to the primary tumour (dissemination), becoming circulating tumour cells (CTCs) which can be transported in blood to distant regions of the body [6–8]. Alongside single CTCs, circulating tumour cell clusters (CTC clusters) have been detected in the blood of cancer patients [9–13]. CTC clusters, which are disseminated cell aggregates of up to 50 tumour cells, have been shown to have an up to 50-fold higher chance of forming metastases than single CTCs, and are therefore associated with worse clinical outcomes [9, 14–16]. This higher metastatic potential may be attributed to the increased resilience of CTC clusters in circulation, compared to single CTCs, which in turn increases the probability of dissemination into a distant organ [12, 17]. Further, it has been shown that CTC clusters originate as cell aggregates from the original primary tumour, rather than through intravascular aggregation or proliferation of singular CTCs [9, 18]. However, the cellular and micro-environmental factors which promote CTC cluster formation are still largely unknown.

Desmosomal proteins have been previously described to be associated with cell aggregation and, in particular, high plakoglobin expression levels have been found in CTC clusters [9, 19, 20]. Desmosomes are cell junctions which stabilise the connection between neighbouring epithelial cells. In desmosomes, the transmembrane proteins desmocollin 1–3 and desmoglein 1–4, which belong to the cadherin superfamily, form homo- and heterophilic interactions and are intracellularly connected to the intermediate filament cytoskeleton through desmosomal plaque proteins, such as plakoglobin and plakophilin (members of the armadillo family) and

desmoplakin (member of the plakin family of cytolinkers) [21–23]. One theory is that an abundant expression of desmosomal proteins could lead to enhanced intercellular adhesion between disseminating tumour cells, both during CTC formation and vascular transport [9, 18, 24]. To date, studies focusing on the expression of various desmosomal proteins in a variety of primary cancer types have shown both tumour-suppressive and tumour-promoting effects on growth and metastases [9, 25–27]. Recently, the desmosomal protein desmoglein 2 (DSG2) has been associated with a poorer prognosis and higher recurrence risk in breast cancer patients. DSG2 expression is regulated by hypoxia in breast cancer cells and increases the prevalence of CTC clusters, facilitating distant metastasis [25].

This study focused specifically on desmocollin 2 (DSC2)—a transmembrane cell anchoring protein—in primary breast cancer, for which the role in breast cancer metastases formation is still not completely understood. Several studies have found that DSC2 proteins are abnormally expressed in various types of cancer and correlate with cell proliferation and invasive behaviour [28, 29], and showed that a high expression of DSC2 increased cell aggregation [20, 30]. A recently published study by Li et al. accentuates that elevated DSC2 expression, in combination with the desmosomal protein Plakophilin-1 (PKP1), can activate PI3K/AKT or CDH1 to increase cluster formation to resist shear-stress-induced cell death. Furthermore, higher expression of DSC2 and PKP1 was correlated with lower overall survival and worse disease progression in patients with breast and lung cancer [31]. The aim of this study was to investigate the potential of DSC2 at mRNA and protein level as a predisposing factor for breast cancer progression and the development of breast cancer metastases, in particular to the lung and brain.

Methods

Patient cohorts

All patients, from whom the tissue samples were derived, were treated at the University Medical Centre Hamburg-Eppendorf, Germany, Department of Gynaecology between 1991 and 2002. All patients gave written approval for the utilisation of their tissue samples and the reviewing of their medical records according to our investigational review board and ethics committee guidelines (Ethik-Kommission der Ärztekammer Hamburg,

#OB/V/03). Further cohort details and patient characteristics are listed in the Additional file 2: Table S1. Microarray analyses of DSC2 mRNA levels in patients with and without distant metastases were performed on 197 mRNA extracts from primary breast cancer tissue samples. For the western blot, a total of 111 samples were collected based on tissue availability from the same patient cohort. Slides of four tissue microarrays, constructed under permission of the Ethikkommission Beider Basel (EKBB # 395/11), kindly provided within collaborative efforts in the frame of the Pathobiology study group of the EORTC by Dr. Serenella Eppenberger-Castori from the Biobank at Institute of Medical Genetics and Pathology at the University of Basel, Switzerland, were used for immunhistochemical analysis. Patient characteristics are supplied in Additional file 3: Table S2.

Microarray data

We analysed DSC2 mRNA levels using microarray data (Affymetrix HG-U133A) from the aforementioned cohort. Here, two probe sets (204750_s_at and 204751_x_at) corresponding to DSC2 were available and analysed independently. Additionally, the mean expression value of the 2 probe sets was calculated and also included in further analyses. According to the DSC2 mRNA values of each probe set and the mean value, the cohort was divided into quartiles of similar size, representing low, moderate-low, moderate-high, and high DSC2 levels. Correlations between DSC2 mRNA levels (quartiles) and clinicopathological factors, such as histological grading, stage, lymph node involvement, oestrogen, and progesterone receptor status (ER, PR) were statistically examined by χ^2 -tests. Overall survival was analysed by Kaplan-Meier analysis and log-rank tests. Additionally, the correlation between DSC2 mRNA levels (continuous data) and disease-free and overall survival was calculated using Cox regression analyses. Multivariate Cox regression analyses including the clinical stage, nodal involvement and molecular subtype were performed for all probe sets and the DSC2 mean value. Here, a backwards analysis with stepwise removal of insignificant terms was used. Probability values less than 0.05 were regarded as statistically significant. All statistical analyses were conducted using SPSS software Version 26 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). For validation purpose we used an independent Affymetrix microarray dataset consisting of 572 breast cancer samples from Gene Expression Omnibus (GSE2603, GSE2034, GSE12276) for which detailed information on metastatic localization was available [32].

Protein lysate preparation and western blot analysis

Tissue samples were obtained intraoperatively and immediately stored in liquid nitrogen as fresh frozen

samples. The histological characteristics of each sample were evaluated on cryo-cut and haematoxylin-eosin-stained sections. The tissue was tailored, where necessary, to obtain at least 70% tumour cells in the sample used for protein extraction. Approximately 100 mg of tissue was excised and pulverised using a micro-dismembrator (Braun-Melsungen, Melsungen, Germany) for 2 min and 45 s at 200 r.p.m. Proteins were lysed in ice-cold sample buffer (50 mM Tris pH 6.8, 1% sodium dodecyl sulphate (SDS)), 10% sucrose and 10 μ l/ml protease inhibitor cocktail (Sigma, Taufkirchen, Germany). For western blot analyses, volumes of tumour lysates containing 20 μ g of protein were loaded per well. The following antibodies were utilised in the western blot detection process: mouse monoclonal anti-DSC2 IgG (Millipore, MABT411) dilution 1:1000, mouse monoclonal anti- β -Actin (C4) (Santa Cruz Biotechnology, sc-47778) dilution 1:2000 and goat anti-mouse IgG-HRP (Santa Cruz Biotechnology, sc-2055) dilution 1:8000. Antibodies were visualised using a chemiluminescent reagent (SuperSignal® West Pico chemiluminescent Substrate, Thermo Scientific, Rockford, USA). Protein band intensities were quantified using a calibrated densitometer (GS-800 Imaging Densitometer, Bio-Rad, Munich, Germany). The primary breast cancer protein lysate UPA497 was used as a positive control for DSC2, with its DSC2 expression being defined as 100% for the purpose of standardisation. Protein expression values in all detected bands were also normalised using the loading control β -Actin. For the statistical analyses, these values were divided into four equal groups (quartiles), representing very low, low-moderate, moderate and high protein expression.

Breast cancer cell lines, cell culture and stable transfections

The human TNBC cell line MDA-MB231 and its brain seeking subline MDA-MB231-BR were provided by Dr Takara (University of Texas). Cells of both lines were cultivated in Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM, ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, USA) supplemented with 10% fetal calf serum (FCS) under standard cell culture conditions. Cells were authenticated before usage. Two different DSC2-knockdown MDA-MB231-BR cell lines were generated by lentiviral transduction using vectors containing shRNA-sequences targeting specific regions of the DSC2 mRNA sequence (MISSION shRNA III and V, Sigma-Aldrich, GmbH). Similarly, a control cell line was established using a scramble shRNA sequence (Addgene, plasmid ID1864). The full DSC2 cDNA sequence obtained from a commercially available vector (Des476-Desmocollin 2-myc Plasmid; Addgene Plasmid ID: 32233) was cloned into LeGO-iC2-Puro + Plasmid (kindly provided by AG Fehse, Center for Oncology, Department of Stem Cell Transplantation, UKE,

Hamburg, Germany) using BamHI and EcoRI restriction enzymes. After lentiviral production in HEK293T cells, MDA-MB231 cells were transduced. The corresponding empty vector was taken as a negative control. After selection with puromycin (2 μ g/mL), the level of DSC2 mRNA and protein was detected using real time quantitative polymerase chain reaction RT-PCR and western blot analysis, respectively.

RNA isolation and real-time quantitative polymerase chain reaction

RNA was isolated using the RNeasy Mini Kit (Qiagen, Hilden, Germany) and a QIAshredder (Qiagen, Hilden, Germany), and was subsequently reverse transcribed using qScriber cDNA Synthesis Kit (HighQu, Kraichtal, Germany) according to the manufacturer's instructions. RT-PCR was carried out with ORA™ qPCR Green ROX H Mix (HighQu, Kraichtal, Germany) using the StepOnePlus System (Applied Biosystems, Thermo Fisher Scientific Inc.). The data analysis was performed using the $\Delta\Delta Ct$ method. The following primers were used for DSC2: forward primer, 5'-GCCCATCTTCTTGTGTC GTT-3'; reverse primer, 5'-CCCGTCTGGTGAAAAAG TGT-3'. Primer sequences for the housekeeping gene were as follows: forward primer, 5'-GTCAGTGGTGG CCTGACCT- 3'; reverse primer, 5' -TGCTGTAGCCAA ATT CGTTG-3'.

Immunofluorescence

Cells (1×10^5) were seeded on coverslips, cultured for 48 h, and fixed with 3.7% formaldehyde for 20 min at room temperature. After blocking with 1% bovine serum albumin (BSA) in phosphate buffered saline (PBS) (Mg $^{+}$ /Ca $^{+}$) for 1 h at room temperature, cells were incubated with a polyclonal DSC2 antibody (1:50 in 1% BSA/PBS; Sigma-Aldrich, Hamburg, Germany) over night at 4 °C. Subsequent to washing, cells were incubated with a second antibody solution (mouse anti-rabbit IgG Alexa Fluor® 488; Jackson ImmunoResearch, Ely, UK; 1:500 in 1% BSA/ PBS) for 1 h at room temperature. Coverslips were carefully placed on slides using mounting medium and DAPI (Vectashield). Images were acquired using a fluorescence microscope BZ9000 and the software BZII Viewer (Keyence, Germany).

Proliferation assay

For cell proliferation analyses, the Cell Proliferation Kit II (XTT) (Roche Applied Science, Mannheim, Germany) was used according to the manufacturer's instructions. Briefly, cells were seeded in a final volume of 100 μ l medium per well in a 96-well plate (1.5×10^3 MDA-MB231-BR cells per well, 2×10^3 MDA-MB231 cells per well). After 24 h, 48 h and 72 h, cell viability

was determined by adding XTT labelling mixture and by measuring the absorbance after 6 h at 490 nm using a microplate reader (DIAS Max002, Dynex Technologies, Chantilly, USA). Each experiment was performed with 12 replicates (wells) per condition ($n=12$). Images shown are representative of three independently performed experiments.

Cytotoxicity analysis

For the MDA-MB231-BR cell line and the DSC2-knock down sublines, an Annexin-V/PI staining was performed after cisplatin treatment in order to quantify the extent of apoptotic and necrotic cells. Briefly, cells were seeded into 6-well plates at a density of 2.5×10^5 cells per well, incubated for 24 h and treated with cisplatin (Accord Healthcare Limited, North Harrow, United Kingdom) in three different concentrations (10 μ M, 25 μ M, 50 μ M) for 48 h using serum-reduced DMEM medium. Subsequently, cells within the supernatant, as well as adherent cells, which were carefully detached using AccuMax (eBioscience, San Diego, CA, USA), were stained with an APC-labelled Annexin-V antibody (Annexin-V-APC, AnxA100, MabTag GmbH, Oldenburg, Germany) for 30 min at 4 °C in the dark. After washing with PBS (+/+), cells were resuspended in 1% BSA in PBS and stained with PI (BD Pharmingen, San Diego, CA, USA). FACS analysis was performed using the FACS Calibur (BD Biosciences, Heidelberg, Germany) and all data were analysed using FlowJo Software.

DSC2 overexpressing and control MDA-MB231 cells display a strong fluorescence, due to the transduction with the previously mentioned LeGO-iC2-Puro + Plasmid, which includes the mCherry-coding sequence. For these cell lines, the cisplatin-induced cytotoxicity was assessed using XTT, as described above. Briefly, MDA-MB231 cells were seeded into 96-well plates with 2×10^4 cells in 100 μ l per well. After incubating for 24 h, cells were treated with cisplatin in three different concentrations (10 μ M, 25 μ M, 50 μ M) for 48 h and the Cell Proliferation Kit (Roche) was used as described in the previous section. Each experiment was performed in duplicates. Images shown are representative of three independently performed experiments.

Migration assay

To investigate cell migration, the Oris™ Universal Cell Migration Kit (Platypus Technologies, Madison, WI) was used according to the manufacturer's protocol. Briefly, cells were seeded (5×10^4 cells in 200 μ l per well) in a 96-well plate fitted with sterile silicon stoppers using serum-reduced medium (5% FCS). After 24 h incubation, stoppers were gently removed allowing cells to migrate into the central cell-free detection zone. Migration

potential was assessed by analysing the cell-free area of each well at four different time points (0 h, 24 h, 48 h and 72 h post removal of stoppers) with the ImageJ Wound Healing Tool (Wayne Rasband, National Institute of Health). Each experiment was performed with 12 replicates (wells) per cell line. Images shown are representative of three independently performed experiments.

Invasion assay

Matrigel Growth Factor Reduced (BD Biosciences, Heidelberg, Germany) was diluted to a concentration of 3.5 mg/ml with serum-free medium. Afterwards, 96-well plates were coated with a 1:1 mixture of Matrigel and serum-reduced medium (5% FCS) and incubated for 30 min at 37 °C. Hereafter, Oris™ Universal Cell Migration Kit (Platypus Technologies, Madison, WI) was used according to the manufacturer's protocol as described above. After a 24 h incubation period, the stoppers and medium were carefully removed and 40 µl of newly prepared Matrigel coating solution was added. Plates were incubated again for 30 min at 37 °C. Finally, serum-reduced medium was added to all wells. For determining cell invasion potential, analyses were performed as described above. Each experiment was performed with 12 replicates (wells) per cell line. Images shown are representative of three independently performed experiments.

Cell spheroid formation

Cells were seeded at 5×10^3 cells in 200 µl medium per well on 2% agarose-coated (UltraPure™ Agarose, Invitrogen, Carlsbad, CA, USA, dissolved in PBS) 96-well plates. To assess and observe spheroid formation of cells, spheroids were examined and documented every second day using light microscopy and a camera (Axiovert 40C, Carl Zeiss AG, Leica DFC320, Wetzlar, Germany). For further investigation of compactness, spheroids were dissociated by pipetting each spheroid up and down five times and by comparing formation immediately afterwards. Each cell line was seeded in quadruplicates. Images shown are representative of three independently performed experiments.

Cytotoxicity in a 3D Model

Cisplatin-induced cell cytotoxicity on 3D-structures was assessed using immunocytochemical detection of phosphorylated gamma H2AX (γ H2AX)—an established marker for DNA double-strand breaks—on tumour cell aggregates grown on polyHEMA (Sigma-Aldrich) coated flasks. Here, cell lines were seeded at a density of 2×10^6 cells in 12 ml per polyHEMA coated T75 culture flask and cultured as cell aggregates for 72 h. Subsequently, cells were incubated with cisplatin in a final concentration of 50 µM for 8 h and 24 h, and were subsequently

fixed in formalin, embedded into 2% agar (Agar NOBEL, Difco Laboratories, Detroit, MI, USA) and then embedded in paraffin. Slides from FFPE-cells were pre-treated in a steamer (citrate buffer pH 6.0) at 125 °C for 4 min and S1699 (pH 6.0, DAKO) at 121 °C for 10 min, respectively) and incubated with an anti-DSC2 (1:25 HPA011911, Atlas Antibodies, Sigma-Aldrich, Hamburg, Germany) or an anti- γ H2A.X antibody (1:10,000; ab81299, abcam, Berlin, Germany) for 1 h at room temperature. Incubation with biotin-labelled swine anti-rabbit secondary antibody occurred for 30 min at room temperature (1:200 dilution in TBS, E0353, DAKO, Glostrup, Denmark). For detection, sections were incubated with Vectastain® ABC-AP Kit (Vector Laboratories, Burlingame, CA USA) for 30 min and stained with Permanent Red (K0640, DAKO, Glostrup, Denmark). Rabbit immunoglobulin normal fraction (X0903, Agilent, Santa Clara, CA, USA) was used as a negative control for the anti- γ H2A.X primary antibody. A rabbit polyclonal IgG (ab37415, abcam, Berlin, Germany) was used as a negative control for anti-DSC2 primary antibody. All slides were slightly counterstained with haematoxylin. Stained slides were scanned using the Axio Scan.Z1 (Zeiss, Jena, Germany) and images were acquired using netScope Viewer Pro software version 1.0.7079.25167 (NetBase Software GmbH, Freiburg, Germany). For quantifying the γ H2A.X staining, manual counts of positive stained cells (4 × 100 cells in 4 different areas of each slide) were performed using the assistant electronic memory counter Counter AC-15 (Karl Hecht Assistant, Altnau; Switzerland).

Intracardiac metastasis mouse model

The intracardiac mouse model was conducted as previously described [33]. Briefly, female 8 to 9-week-old SCID mice (CB17/lcr-Prkdcscid/lcrIcoCrl) were anaesthetized and 1×10^6 tumour cells were injected intracardially into the left ventricle of the heart (n = 15 per group). Tumour cells were previously transduced with luciferase-bearing plasmid and bioluminescence signals were tested before injection via bioluminescence imaging (BLI). After intracardiac injection, tumour cell dissemination was monitored weekly under BLI. Assessment of subsequent metastases was monitored in vivo weekly by imaging for up to 3 weeks. Mice showing termination criteria were immediately sacrificed. At the endpoint (21 days), animals were anaesthetized and blood was collected from the left ventricle by cardiac puncture immediately before the final killing was executed by cervical dislocation. Ex vivo bioluminescence imaging was conducted from the lungs and brain. Lungs and brain were equally divided and frozen down for DNA isolation and subsequent ALU-PCR or paraffin-embedded for further analysis (H&E and luciferin staining) as previously described [33, 34]. The

animal experiments were approved by the Authority for Social Affairs, Family, Health, and Consumer Protection of the Free and Hanseatic City of Hamburg through application N005/2020.

Histology and immunohistochemistry

The whole brain and the right lung of the mice were fixed in 4% buffered formalin and processed for wax histology. 4 µm sections were cut from brain for immunohistochemistry and 10 sections from the middle of the block were stained with hematoxylin and eosin (H.E.). The lungs were fixed en block and subsequently cut into 1 mm thick slices and embedded in 2% agar. Afterwards, the lung slices were paraffin-embedded and cut into 4 µm thick sections. Ten sections of each paraffin wax block were H.E. stained and metastases were counted at a 200-fold magnification using Zeiss Axiophot photomicroscope (Zeiss, Jena, Germany). Additionally, two series of serial sections out of the middle of each paraffin wax block were preserved for further immunohistochemical analyses. The immunohistochemical staining was performed on 4 µm sections. Sections were deparaffinized in descending ethanol concentrations and pre-treated with citrate buffer solution (pH 6.1) in a steamer for 4 min. After incubation for 1 h at room temperature with the primary antibody DSC2 (Atlas, HPA011911), samples were washed twice with TBS-T (TBS + 0.1% TWEEN-20) and once with TBS for 5 min. After incubation with anti-rabbit secondary antibody (LS-Bio, LS-C350860) for 30 min at room temperature, antibody binding was visualized using the Vectastain ABC-AP Kit (VectorLabs, Burlingame, CA, USA) and Permanent Red Solution (Dako) according to the manufacturer's instruction. The nuclei were counterstained in Mayer's hemalum solution.

Circulating tumour cell detection

Mouse blood samples (200–500 µl) were obtained via cardiac puncture and collected into EDTA KE/1.3 tubes (Sarstedt, Germany). To perform cardiac puncture, mice were deeply anaesthetized under isoflurane, and a 21-gauge needle coated with heparin was inserted into the heart. Mice were euthanized immediately following the cardiac puncture. Blood samples were processed on the label-independent, microfluidic system Parsortix® (ANGLE plc., United Kingdom), a device designed for the size-based capture of rare cells from whole blood [35]. The isolated cells were harvested and spun onto a glass slide (190 g, 7 min). Slides were dried overnight at room temperature and stored at –80 °C until further analysis.

Tumour cells isolated with the Parsortix® system were identified via immunocytochemistry. Briefly, dried cyto-spin slides were brought to room temperature and fixed with 2% PFA (Sigma Aldrich, Germany) for 10 min. The

samples were washed with 0.5 mL of 1x-PBS prior to permeabilization with 0.1% Triton X 100/PBS (Sigma Aldrich, Germany) for 10 min. Following two additional wash steps, 10% AB-serum/PBS (BioRad, Germany) was applied for blocking (60 min). Standard detection of CTCs is usually achieved with epithelial antibodies [36], however, TNBC cells lack epithelial markers and are successfully detected with CD298 [37]. Subsequently, directly anti-human PE labelled CD298 (clone LNH-94, Biolegend, USA) and anti-mouse Alexa Fluor 488 conjugated CD45 (clone HI30, Biolegend, USA) antibodies were incubated for 60 min, followed by 5 min of DAPI-incubation (1 µg/mL). Cyto-spins were covered with Prolong Gold Antifade Reagent (Thermo Fisher Scientific, Dreieich, Germany), sealed with a cover slip and examined by fluorescence microscopy (Axio Observer 7, Zeiss). CD298-positive, DAPI-positive, CD45-negative cells with intact morphology were defined as tumour cells. Clusters were defined when 2 or more cells were found together.

Statistical analyses

All statistical analyses were performed using SPSS Statistics version 24 for Windows (IBM, Armonk, NY, USA). Correlations between mRNA and protein expression values were assessed using two-sided Pearson tests. Chi-square tests were used to correlate both mRNA expression (Microarray data, cohort A) and protein expression (WB data, cohort B) with the following clinical and pathological parameters; histological grading (G1/G2/G3), molecular subtype (Luminal/HER2 positive/TNBC), ER and PR Status (positive/negative) and the presence of metastases (loco-regional/bone/lung/visceral/brain). Kaplan-Meier estimates and the log-rank test were carried out to ascertain and compare disease-free and overall survival. The associated hazard ratios for the multivariate analyses were determined by Cox regression. Proliferation assays and cytotoxicity assays measured with XTT were statistically analysed using GraphPad Prism 5 (GraphPad, La Jolla, CA, USA). Each in vitro assay was performed at least three times. Statistical significance was assessed using unpaired two-tailed Student's t-test. The assumption of homogeneity of variances was checked via Levene's Test of Equality of Variances ($p > 0.05$). Results are given as mean ± s.d. or s.e. Probability values (p -value) ≤ 0.05 were considered to be statistically significant.

Results

High DSC2 mRNA levels are associated with the triple negative breast cancer subtype, an increased brain and lung metastasis risk and a decreased disease-free and overall survival for breast cancer patients

DSC2 mRNA levels were evaluated in 197 tumour samples of breast cancer patients using microarray data

from our own cohort (see description in material and methods). Two different probe sets (204750_s_at and 204751_x_at) corresponding to DSC2, as well as the mean value of these two probe sets, were analysed. For each probe set and the mean value, the cohort was firstly divided into quartiles (Q) according to DSC2 expression: low (Q1), moderate-low (Q2), moderate-high (Q3), and high (Q4). Correlations between DSC2 mRNA levels and clinicopathological factors such as histological grading, stage, lymph node involvement, oestrogen and progesterone receptor status (ER, PR) and molecular subtype, showed a significant association between high DSC2 levels (Q4) and higher tumour grading (in one probe set), ER- (in one probe set and the mean value), PR-negativity (in one probe set) and molecular subtype (in two probe sets and the mean value), whereas no correlation between DSC2 and tumour stage or nodal status was found. Further, high DSC2 mRNA levels significantly correlated with the development of cerebral metastases (in one probe set and the mean value). Survival analyses showed a significant correlation between high DSC2 values and a shorter overall survival (in both probe sets and mean value) and disease-free survival (in both probe sets and the mean value). All mentioned statistical correlations using DSC2 quartiles or continuous values are listed in the Additional file 4: Table S3, including the corresponding p-values.

For the DSC2 mean values, further analyses were carried out and are represented in Fig. 1. Here, HER2-positive and TNBC, which represent the most aggressive molecular subtypes, display higher DSC2 mRNA levels in comparison to the luminal subtype ($p < 0.005$; Fig. 1A). Also, primary tumours from patients that developed brain metastases showed higher DSC2 levels than those with no cerebral metastases ($p = 0.012$; Fig. 1B). Kaplan Meier analysis showed a significant association between high DSC2 levels and shorter overall survival using quartiles ($p = 0.035$; Fig. 1C) and a clear trend in the correlation between DSC2 and disease-free interval ($p = 0.051$; Fig. 1C). When we grouped patients included in quartiles Q1 to Q3 and compare them with patients with high DSC2 level (Q4) the differences in overall and disease-free survival became stronger ($p = 0.004$ and $p = 0.015$, respectively; Fig. 1C). In multivariate Cox regression analyses, including clinical stage, nodal involvement, and molecular subtype, DSC2 remained a prognostic indicator for disease-free survival ($p = 0.008$; HR 2.071; 95% CI 1207–3553, Additional file 4: Table S3). Interestingly, in a stratified survival analysis using this cut-off (cut-off-Q4), we found that the impact of DSC2 on overall survival (not shown) and disease-free survival was limited to the group of TNBC and HER2-positive patients ($p = 0.0016$ and $p = 0.004$, respectively; Fig. 1D), whereas in patients with luminal breast cancer the DSC2 level did not influence the survival time.




Fig. 1 Quantitative expression of DSC2 mRNA in primary breast cancer tissue and its correlation with clinicopathological variables. **A** The TNBC molecular subtype is significantly associated with high DSC2 expression ($p < 0.005$). **B** A highly significant association between the development of cerebral metastases and high DSC2 expression was observed ($p = 0.012$). **C** Both, the disease-free survival ($p = 0.051$; right) and the overall survival ($p = 0.035$; left) are reduced in patients whose tumours express high levels of DSC2. **D** Stratification analysis showed a significant association between high DSC2 levels and shorter disease-free survival only in patients with HER2-positive and TNBC

The impact of DSC2 on disease-free survival could be corroborated in a second cohort including 572 breast cancer samples (see description in material and methods and Additional file 1: Fig. S1). Here, we found a significant correlation of DSC2 mRNA expression with molecular subtype ($p < 0.001$; Additional file 1: Fig. S1A), brain and lung metastasis formation ($p = 0.003$ and $p < 0.001$, respectively; Additional file 1: Fig. S1B, C), as well as with disease-free survival ($p < 0.001$; Additional file 1: Fig. S1D) and, specifically, brain metastasis-relapse free survival ($p < 0.001$; Additional file 1: Fig. S1E).

Western blot analyses detected a wide variance in DSC2 expression in primary breast cancers and a significant association with DSC2 mRNA levels

Of the 197 tumour samples tested in the microarray analyses, 111 were further analysed at a protein level using western blot. Patient characteristics were similar in both groups (Additional file 2: Table S1). The western blot

results showed a wide range of DSC2 expression, varying between very low and very high expression. Additional to the expected band at 110 kDa, as described in the biological information provided by the antibody manufacturer, one or more additional bands were detected by the anti-DSC2 antibody in most samples (Fig. 2A). These bands presented, for the majority of the samples, as two double band sets between 60 and 85 kDa, and 93 and 110 kDa respectively. All samples were (at least lightly) positive for at least one of these double band sets. Since the origin and nature of these additional bands was not clear, both double band sets (individually and combined), as well as the single DSC2 band at 110 kDa (as specified by the manufacturer) were quantified by densitometry. The single band at 110 kDa and the double band between 93 and 110 kDa correlate with a coefficient of $r = 0.936$, while all bands combined (both double band sets) show a correlation of $r = 0.676$ (both $p < 0.0000$; Additional file 5: Table S4). In addition, all bands showed a moderate and




Fig. 2 Quantitative expression of DSC2 in primary breast cancer protein lysates and its correlation with clinicopathological variables. **A** Western blots depicting representative expression of DSC2 in a variety of primary breast cancer samples. Protein lysates from the breast cancer cell line T47D, as well as the breast cancer lysate UPA 497, were used as positive controls for DSC2. β-actin protein expression was quantified as a loading control. Tumours with high DSC2 levels are significantly associated with the TNBC molecular subtype (**B** all WB DSC2 bands; $p = 0.017$ and **E** upper WB DSC2 band; $p = 0.023$). A significant association was observed between high DSC2 expression and the development of pulmonary metastases (**C** all WB DSC2 bands; $p = 0.049$ and **F** upper band; $p = 0.052$). Disease-free survival in accordance with DSC2 expression levels: Patients with a moderate to high DSC2 expression level have a significantly shorter disease-free survival, compared with patients whose tumours possess no or little DSC2 (**D** all WB DSC2 bands; $p = 0.049$ and **G** upper WB DSC2 band; $p = 0.157$). **H** Immunohistochemical analysis of primary breast cancer tissue confirmed a significant association between high DSC2 levels and TNBC subtype ($p = 0.046$). Representative DSC2 staining results from luminal (**I–J**), HER2 positive (**K–L**) and TNBC (**M–N**)

significant correlation with DSC2 mRNA expression as obtained via microarray analyses (Pearson correlation coefficient $r > 0.4$; $p < 0.001$; Additional file 5: Table S4). These results suggest that all bands are isoforms and/or a result of different posttranslational modification, i.e. glycosylation. In the following analyses, we confine ourselves to the collective assessment of all detected DSC2 bands, as well as to the upper band, although similar results were obtained from analyses of each individual band, as well as each double band set.

The significant trend between molecular subtype and DSC2 expression seen at mRNA level could also be demonstrated at a protein level. While high DSC2 levels were significantly associated with the TNBC subtype, moderate and low DSC2 levels were more often observed in the HER2 and luminal subtypes respectively ($p = 0.017$ and $p = 0.023$; Fig. 2B and E). This association was further substantiated by the findings that tumours lacking PR- and ER- expression were likewise individually significantly associated with high DSC2 levels (all bands: $p = 0.046$ and $p = 0.04$ and upper band: $p = 0.054$ and $p = 0.012$ respectively; Additional file 1: Fig. S2). High DSC2 expression was, at the protein level, significantly associated with an increased risk of pulmonary metastases (all bands: $p = 0.049$ and upper band: $p = 0.052$; Fig. 2C and F). There was no significant association between high levels of DSC2 and increased risk of developing cerebral metastases in our cohort, although a trend towards this effect was observed (all bands: $p = 0.405$, upper band: $p = 0.42$). Patients whose tumours possessed increased levels of DSC2 sustained a shorter disease-free survival period in comparison to patients with low DSC2 expression (all bands: $p = 0.049$ and upper band: $p = 0.157$ Fig. 2D and G). No significant trend was observed between the patients' overall survival and the level of DSC2 expressed in their tumour.

Immunohistochemical verification of DSC2 expression in primary breast cancer samples

To further validate our findings at the protein level, DSC2 immunohistochemical staining was carried out on primary breast cancer samples included in four different tissue microarrays (TMAs). From the original 340 punctures included in the TMAs, only 243 could be evaluated. The remaining, non-analysable punctures were missing, lacking tumour cells or necrotic. Further, only primary breast cancer tissue was included in our analyses ($n = 226$), adjacent healthy tissue or metastatic tissue was excluded. DSC2 expression was observed exclusively in tumour cells in all biopsies. In positively stained tumour cells, we observed mainly a membranous staining, although DSC2 could be also detected in a minority of samples within the cytosol. Patient survival data was

only available for a small group of samples and therefore corresponding correlation analyses were not performed. Information regarding the molecular subtype was available for 175 tissue samples. Here, we evaluated 21 luminal, 77 HER2 positive and 77 TNBC tissue samples. A positive DSC2 staining was detectable in 38% of the luminal, in 48% of HER2 positive and 64% of TNBC biopsies (Fig. 2H). While all positive stained luminal samples showed a moderate staining ($2 < IRS < 6$), approx. 20% of HER2 positive and TNBC tumours displayed a strong DSC2 staining ($IRS > 6$). Figure 2 shows representative DSC2 staining results from luminal (Fig. 2I, J), HER2 positive (Fig. 2K, L) and TNBC (Fig. 2M–L).

Generation of DSC2-knockdown and overexpression in triple negative breast cancer cell lines

To assess the impact of DSC2 in breast cancer cells, we performed DSC2 knockdown in MDA-MB231-BR cells, which endogenously express a higher level of DSC2 than the parental cell line MDA-MB231. Among all sublines generated by transfection with 5 different DSC2-specific shRNAs sequences, shRNA III and V—which showed around 70% and 60% DSC2-knockdown at mRNA level (Fig. 3A) respectively, compared to the scramble control—were chosen for further analysis. A clear reduction in the DSC2 expression level in these cells could be corroborated by western blot (Fig. 3B). In addition, we chose the parental cell line MDA-MB231 for DSC2 overexpression. Here, stable lentiviral transduction with the LeGO-iC2 DSC2 vector induced a strong DSC2 overexpression in comparison with the empty vector-transduced cells, as detected by qRT-PCR and western blot (Fig. 3B). Here, the membranous localisation of DSC2 was further corroborated using immunofluorescence and flow cytometry (Fig. 3C and D, respectively).

Influence of DSC2 expression on the proliferation, migration, invasion and chemosensitivity of breast cancer cells in a 2D cell culture

The impact of reduced or increased DSC2 expression on diverse cellular properties of the TNBC cells was analysed in 2D cell culture conditions using the stably transfected MDA-MB231-BR and MDA-MB231 cells as previously described. We observed no significant differences in cell proliferation between MDA-MB231 control cells and those with increased DSC2 expression (LeGO-iC2 DSC2; Fig. 4A, upper panel). A significant increase in proliferation was only observed between MDA-MB231-BR scramble control cells and those with reduced DSC2 expression (only in shRNA III cells) after 72 h. As this result was observed only in 1 of 3 experiments (Fig. 4a, lower panel), we conclude that a DSC2 down-regulation does not affect cell proliferation in the brain-seeking cell




Fig. 3 Desmocollin 2 knock down and overexpression in TNBC cell lines. DSC2 knock down in MDA-MB-231-BR cells and DSC2 overexpression in MDA-MB-231 cells were performed and validated at mRNA level via qRT-PCR (**A**) and protein level using Western Blot (**B**). Additionally, membranous DSC2 expression was visualized and quantified by immunofluorescence (**C**) and flow cytometry (**D**)

line. In wound healing assays with silicon stoppers, DSC2 knock down in the shRNA III clone led to a significant (yet slight) increase in cell migration and therefore to an accelerated wound closure, whereas the shRNA V clone resembled the scramble control. Accordingly, DSC2 overexpression decreased cell migration and therefore slowed wound closure, however the difference is again too small to be conclusive (Fig. 4B).

Furthermore, when comparing MDA-MB231-BR cells with reduced DSC2 expression to MDA-MB231-BR control cells, no significant differences in the amount of apoptotic and necrotic cells, measured by flow cytometry and Annexin V and PI staining, respectively, could be noted after exposure to the cytostatic drug cisplatin for 48 h. The chemosensitivity of MDA-MB231 cells was also not affected after DSC2 overexpression, as measured using an XTT-assay (Fig. 4C).

Impact of DSC2 expression on breast cancer cell aggregation and chemosensitivity in a 3D cell culture

We next analysed the impact of DSC2 overexpression and DSC2 knock down on the cellular properties of the two TNBC cell lines in a 3D model. We observed clear

differences in the aggregation capacity between the different sublines, as shown in Fig. 5A. Here, MDA-MB231-BR cells with reduced DSC2 expression (shRNA III) failed to build compact spheroids in comparison to the corresponding control cells (scramble shRNA), when seeded on agarose coated surfaces. The differences in the aggregation capacity and compactness were even more clear after mechanical disaggregation by slowly pipetting, showing full disaggregation mostly to single cells and small cell aggregates of only a few cells in the DSC2 knock down cells, whereas the control cells remained as small cell aggregates that were able to adhere to each other again over time. Contrary to our expectations, MDA-MB231 cells with enhanced DSC2 expression did not show any phenotypical differences in the spheroid formation assay in comparison to the corresponding empty vector control cells. However, we observed a clearly enhanced compactness—which could be confirmed after mechanical disaggregation—when compared with the wild type parental cell line (WT). Quantification of the DSC2 mRNA level in the parental cell line revealed a DSC2 up-regulation (f.c. 2.3; Additional file 1: Fig. S3) in the control cell line (LeG-iC2) compared with




Fig. 4 Impact of DSC2 knock down and DSC2 overexpression on tumour cell proliferation, migration and chemosensitivity in 2D. **A** DSC2 overexpression in MDA-MB231 cells does not affect cell proliferation (upper panel). A slight increase in the proliferation rate was detected in one of the DSC2 knock out clones and only after 72 h cultivation (lower panel). **B** DSC2 overexpression in MDA-MB231 and DSC2 silencing in MDA-MB231-BR cells slightly but significantly decreased (upper panel) and increased (lower panel) the tumour cell migratory ability in a wound closure assay, respectively. **C** Both DSC2 overexpression (upper panel) and silencing (lower panel) did not show any impact on tumour cell chemosensitivity against cisplatin

WT cells. This unspecific and treatment-induced DSC2 deregulation in the MDA-MB231 LeGO-iC2 cells might explain the unexpectedly similar behaviour of the two sublines in the 3D model.

In order to study whether the mechanical stiffness of the cellular aggregates further influences drug diffusion and, in turn, chemosensitivity, we cultured cells of the aforementioned cell lines with different DSC2 expression levels on polyHEMA coated culture flasks, allowing them to form cell aggregates in suspension, and treated them subsequently with cisplatin for 8 and 24 h. The differences in spheroid shape observed in the aforementioned agarose model were also observed under polyHEMA culture conditions. Quantification of cisplatin-mediated DNA intra-strand cross-links (Additional file 1: Fig. S4 & materials and methods) and cisplatin-induced cell cytotoxicity on 3D cellular structures were assessed using immunocytochemical detection of PT-GG adducts and phosphorylated gamma H2AX (γ H2AX)—an established marker for DNA double-strand breaks-, respectively. Here, we observed a significant increase in the number of platin adducts and DNA damaged cells in the MDA-MB231-BR subline with reduced DSC2 expression (shRNA III) compared with the control cells (scramble).

Correspondingly, we observed a significantly reduced number of platin adducts and γ H2AX positive cells in the MDA-MB231 cell line with DSC2 overexpression, when compared with the WT (Fig. 5B).

Reduced DSC2 expression in MDA-MB-231-BR cells decreases metastatic potential in vivo

Next, the role of DSC2 in TNBC cells during metastasis development was analysed in vivo. Here, using the brain-seeking cell line MDA-MB-231-BR, the corresponding scramble and DSC2 shRNA cells (shRNA III) were injected (1×10^6 cells each) intracardially into the left ventricle of 8–9 weeks old female SCID mice. Although 15 mice per group were injected initially, 12 mice showed poor physical condition or strong bioluminescence signals in the lungs and thus needed to be removed at the beginning of the experiment. Therefore, 9 mice in the control group and 10 mice in the DSC2 shRNA group were further monitored weekly by BLI. One mouse from the control group and two from the DSC2 shRNA group showing hind limb paralysis were sacrificed on day 18. The remaining mice were sacrificed 21 days after cancer cell injection. Figure 6A shows representative bioluminescence images of three mice and their corresponding




Fig. 5 Impact of DSC2 knock down and DSC2 overexpression on tumour cell aggregation and chemosensitivity in 3D. **A** DSC2 knock down in MDA-MB231-BR cells led to an impaired tumour cell aggregation in a 3D spheroid formation assay (upper panel), whereas DSC2 overexpression increased the compactness of the spheroids in comparison to WT, which could not be dissociated by mechanical disaggregation. **B** DNA double-strand breaks were quantified in MDA-MB231-BR DSC2 knock down cell vs. control (upper panel) and in MDA-MB231 DSC2 overexpressing cells vs. WT growing in 3D (polyHEMA) after cisplatin treatment using immunocytochemical detection of phosphorylated H2AX (γ H2AX). The quantification of the aforementioned staining revealed a significant increase of cisplatin-induced cell cytotoxicity in DSC2 knock down cells (upper panel) and a significant reduced amount of DNA double-strand breaks in DSC2 overexpressing cells (lower panel)

ex vivo brains from each test group 21 days after injection. The overall tumour burden in both mice groups did not strongly differ, while ex vivo bioluminescence signals in the scramble vs. DSC2 shRNA group (mean values: brain = $2,2 \times 10^8$ vs. $3,6 \times 10^7$ and lung = $1,5 \times 10^8$ vs. $3,4 \times 10^7$ photons/sec), as well as the amount of disseminated tumour cells (DTCs) in the brain and lung by ALU-PCR (mean values: brain = 76,5 vs. 48,3 and lung = 61,6 vs. 23,9 DTCs/60 ng DNA) clearly showed a reduced metastatic load in the DSC2 shRNA group (Fig. 6A and D). In line with this finding, we found a reduced number of circulating tumour cells (CTCs) and circulating tumour cell clusters in the blood samples from mice corresponding to the DSC2 knock down group compared to the control group (Fig. 6C). The histological analysis of the brains and the tumour cell visualization using a specific luciferase staining (Fig. 6D) showed indeed smaller metastatic lesions in DSC2 knock down mice, consisting mostly of single cells or small cell aggregates, whereas larger metastases were found in the brains of the control mice group. The presence of microscopically detectable lung metastases was also confirmed upon histological examination of the right lung. In the DSC2 knock down mice, we detected more intravascular metastases than

established pulmonary metastatic lesions, when compared to the control group (Fig. 6D).

Discussion

Desmosomes are important structures for intercellular adhesion and are functionally present most abundantly in tissue exposed to high levels of mechanical stress, such as the epidermis and myocardium [38]. In recent years, desmosomal proteins have become a point of interest in cancer research. Depending on protein type and primary tumour localisation, both tumour-enhancing and tumour-suppressive effects of desmosomal protein up/down-regulation have been observed [39]. Desmoglein 2, desmocollin 2 (DSC2) and plakophilin 1 (PKP1) have been recently linked to an increased metastatic potential of breast cancer cells by promoting cell clustering and enhanced survival during the tumour cell dissemination process [25, 31]. In the present study, we have analysed the role of DSC2 as a prognostic and predictive factor for primary breast cancer and the development of breast cancer metastases. In order to address this question, DSC2 levels at mRNA and protein levels were correlated with clinical and histopathological data. Our research has been able to show, for the first time, that higher levels of




Fig. 6 Role of DSC2 on TNBC cell dissemination in an intracardiac mouse model in vivo. **A** Representative BLI pictures of whole mice and the corresponding ex vivo brain of each group (MDA-MB231-BR DSC2 shRNA and MDA-MB231-BR scramble shRNA) 21 days after injection. **B** The quantification of ex vivo BLI signals (left panel) and amount of disseminated tumour cells (ALU-PCR; right panel) from brains and lungs revealed a lower metastatic load in organs from mice bearing DSC2 knock down tumours in comparison with those injected with the control cell line. **C** Reduced levels of CTCs and CTCCs (circulating tumour cell clusters) were quantified in the DSC2 knock down group ($n=8$, blood was pooled for analysis) in comparison to the control group ($n=8$, blood was pooled for analysis). Representative pictures of CTCCs isolated from the DSC2 knock down group showing CD298 positivity and a CD45 negative staining. **D** Small metastatic lesions in the brain and lungs were detected by specific luciferase staining. In the brain of DSC2 knock down mice mainly single cells or small cell aggregates were detected, whereas larger metastases were found in the brains of the control scramble mice group. Microscopically detectable intravasal lung metastases in a DSC2 knock down mice and established metastatic lesion in a control mouse. Black file marks metastatic tumour cells

DSC2 in primary breast cancer tissue significantly influence disease progression and metastatic behaviour in HER2 positive and TNBC patients. Functionally, the extent of DSC2 expression in tumour cells directly impacts their capacity to aggregate and, in turn, influences their chemosensitivity, as shown in in vitro analyses after DSC2 up-regulation and DSC2 silencing in the TNBC cell line MDA-MB-231 and its brain-seeking subline MDA-MB-231-BR, respectively. In vivo DSC2 knock down reduces the amount of circulating tumour cells and clusters, and consequently the amount and size of established brain metastases and established metastatic lesions in lung tissue.

As mentioned, desmosomal proteins and specifically DSC2 have been previously investigated in the context of cancer research. For example, in colorectal cancer, DSC2 loss enhances tumour cell growth by altering the Akt/ β -catenin signal pathway [29]. Furthermore, knock-down of desmosomal proteins such as DSC2, DSG2 and plakoglobin was reported to impair cell aggregation and

reduce anoikis resistance in lung and breast cancer cells, while their expression levels were correlated with poor overall survival in lung cancer patients and poor metastasis-free survival in breast cancer patients [19]. A similar effect of DSC2 and DSG2 mediated cell adhesion on cell aggregation was detected in colon cancer spheroids [20]. Aceto et al. detected an up-regulation of plakoglobin and other desmosomal components in CTC clusters of breast cancer patients and revealed its importance for the formation of CTC clusters and distant metastases [9]. And, in a more recent study, breast and lung cancer cells resistant to shear stress revealed an up-regulation of DSC2 and PKP1, leading to more CTC cluster formation and enhanced cell survival in circulation via activation of the PI3K/AKT/Bcl-2 pathway [31]. Here, our findings suggest that the aforementioned DSC2 mediated effect on tumour cell aggregation and survival applies for TNBC as well.

In the present study, we found that tumour DSC2 levels significantly influence the disease-free and

overall survival of breast cancer patients, in particular for patients with primary tumours corresponding to the HER2 positive and TNBC molecular subgroups. Two independent microarray datasets and a western blot cohort corroborated the unfavourable prognostic role of DSC2 and, together with immunohistochemical analysis on an independent cohort, demonstrated a significantly increased expression of the desmosomal protein in the most aggressive molecular subtypes, namely the aforementioned HER2 positive and TNBC. Our results have further highlighted the potential of DSC2 as a predisposing marker for the development of breast cancer metastases to the brain and lungs, and are in line with a previous work by Landemaine et al. who identified DSC2 as a potential predictive marker for lung metastasis in breast cancer [40]. With the rising incidence of breast cancer cerebral metastases, and the lingering difficulty in treating the disease, the ability to identify high risk patients who would benefit from increased prevention would be of great clinical value. In line with a previous study on brain metastasis samples from patients with different tumour entities, which identified DSC2 as a potential marker for brain metastasis development [27], we found that high DSC2 mRNA expression significantly correlated with an increased risk for cerebral and lung metastases, although for the first localization, this trend could not be validated at a protein level. High DSC2 protein expression was, however, significantly associated with the development of pulmonary metastases [41].

Our findings challenge the self-evident hypothesis that up-regulation of desmosomal proteins leads to a more mechanically cohesive primary tumour, and therefore a less aggressive one. Indeed, a possible explanation for the contrary findings is that enhanced tumour cell aggregation through DSC2 up-regulation is a factor which favours the development of CTC clusters, which have a considerably higher metastatic potency than singular CTC [9, 18]. In various studies, apoptotic morphology was detected in single CTCs, but not within CTC clusters. This finding supports the theory that clustering of CTCs leads to a higher metastatic potential by, for example, increasing the probability of survival in the circulation [11, 42]. Marrella et al. showed that shear stress affects CTC survival in vitro, with CTC clusters being more resistant to shear forces than single CTCs [43]. Increasing shear stress values incrementally caused disaggregation of CTC clusters. Shear stress resistant cells were found to express more DSC2 and DSC1 [31], and were more likely to form clusters. Additionally, a link has been drawn between increased CTC cluster density and size, and increased cluster cell survival in vitro [44]. Additional to an increased resilience, the formation of clusters—in particular those with a very high

density—may lead to reduced chemosensitivity and, thus, a survival advantage compared to single CTCs [12, 44, 45]. Enhanced cell–cell interactions in CTC clusters could also confer resistance to anoikis, a form of apoptosis due to deprivation of cell–cell and cell–matrix contacts [12, 19]. Furthermore, heterogenous cluster formation with immune cells, such as macrophages or leucocytes, may provide a mechanism for immune escape [42]. Collectively, these findings indicate that DSC2 mediated cell adhesion is probably of greater functional importance in later steps of the metastatic cascade, such as survival within the circulation and chemoresistance, rather than in the process of dissolution of future metastatic cells from the primary tumour mass.

In the present study, up-regulation of DSC2 in breast cancer cells led, as expected, to an enhanced cellular aggregation capacity and thus the formation of tight 3D cell clusters, while tumour cell aggregates after DSC2 silencing displayed a looser structure which rapidly dissociated when subjected to mechanical stress. Interestingly, higher DSC2 expressing aggregates showed lower apoptotic rates than the corresponding control clusters when treated with cisplatin and, correspondingly, reduced DSC2 expression significantly enhanced tumour cell response to cisplatin. In contrast, we did not observe any effect of DSC2 up- or down-regulation on the chemosensitivity of both TNBC cell lines cultured as a monolayer, indicating that the DSC2-mediated cohesiveness of the 3D tumour cell clusters is the main reason for the altered chemosensitivity. This finding highlights the relevance of in vitro 3D culture models to accurately mimic the in vivo conditions [46]. Tumour cell aggregation significantly influences cell response to cytotoxic drugs, as cells in a spheroid environment are more resistant to radiation and chemotherapeutic agents, a phenomenon known as multicellular resistance (MCR) that has been described for different anticancer drugs, including cisplatin [47]. Possible mechanisms of MCR include signalling-mediated inhibition of apoptosis, an increased proportion of quiescent cells, as well as reduced permeability and, in turn, impeded drug diffusion. Li et al. recently described high DSC2 and PKP1 levels in shear stress-resistant breast and lung cancer, which facilitate cell cluster formation and also activate the PI3K/AKT/Bcl-2-mediated pathway, thereby increasing cell survival [31]. However, the exact mechanism behind the observed DSC2-mediated chemoresistance in our model remains unclear and needs to be elucidated in the context of an ongoing project.

Under 2D culture conditions, up- or down-regulation of DSC2 was found to have only a minor effect on cell migration and invasion, although the tendency of our results is in line with recent studies on adhesion proteins

(for example DSG2) and cell migration [25, 48]. No severe impact of increased or decreased DSC2 expression on cell morphology, proliferation or apoptosis could be detected in our 2D cell culture. These findings contrast with diverse reports describing a clear effect of DSC2 down-regulation on 2D proliferation and/or apoptosis in, for example, breast, prostate or oesophageal squamous cell carcinoma *in vitro* [28, 31, 49], with both a pro- and anti-tumorigenic role being postulated. Thus, the role of DSC2 seems to be entity-specific, or even subtype-specific, as shown in our study with a clear negative prognostic value of DSC2 in HER2 positive and TNBC, yet no impact on survival for patients with luminal breast cancer.

The results of the *in vivo* metastatic model, even though the size of the experiment did not allow a significant conclusion, clearly underline our hypothesis. Reduced DSC2 tumour expression decreases the amount of viable tumour cells in the blood circulation—CTCs as well as CTC clusters—and, as a consequence, reduces the effective formation of distant metastases. Our results are in line with those recently published by Li et al. showing the relevance of dual expression of DSC2 and PKP1 for cluster formation and survival in circulation in a lung cancer cell line in a tail vein injection model [31].

Conclusions

Our results link high DSC2 expression with the TNBC molecular subtype, a higher breast cancer tumour grade and a significantly shorter disease-free survival. Further, we have been able to highlight the potential predictive value of DSC2 for the development of cerebral and pulmonary metastases. Functionally, DSC2 promotes tumour cell aggregation and, in turn, fosters the formation of tight CTC clusters with high metastatic potential. An interesting possibility for future research would be to expand the DSC2 analyses to circulating tumour cells and clusters, as well as pulmonary breast cancer metastases, in order to further clarify the potential of DSC2 as a breast cancer brain and pulmonary metastases marker for clinical use.

Abbreviations

CTCs	Circulating tumour cells
BBB	Blood–brain barrier
BCBM	Breast cancer brain metastases
BM	Brain metastases
DSC2	Desmocollin-2
SDS	Sodium dodecyl sulphate
WB	Western blot
SI	Stain intensity
PP	Percentage of positive cells
TMA	Tissue microarray
TBST	Tris buffered saline with tween
ABC-complex	Avidin–biotin enzyme complex
DAB	Diaminobenzidin

TBS	Tris-buffered saline
SPSS	Statistical Package for Social Sciences
TNBC	Triple negative breast cancer(s)

Supplementary Information

The online version contains supplementary material available at <https://doi.org/10.1186/s12935-023-02896-9>.

Additional file 1: Supplementary Figures, Material and Methods.

Additional file 2: Table S1. Patient characteristics Microarray and Western Blot cohorts.

Additional file 3: Table S2: Patient characteristics TMAs.

Additional file 4: Table S3: Correlation between DSC2 mRNA levels and clinical and histopathological parameter.

Additional file 5. Table S4: Correlation between DSC2 mRNA level and protein level.

Acknowledgements

We are extremely grateful for the excellent technical assistance and expertise of Maila Roßberg, Kathrin Eymann, and Jennifer Schröder-Schwarz. Further, we thank Michael Horn-Glander from the UCCH In Vivo Optical Imaging Core Facility for his support during the mouse experiment.

Author contributions

LOF, CS, KML and US contributed to the conception and design of the study. FR, SB, KL, LOF, CS, TK, TPV and HW performed data analysis and discussed data. FR, SB, LOF, CS, TPV and HW wrote and revised the manuscript. BS, IW, JM, SEC and VM were responsible for material resources and revised the manuscript. All authors read and approved the final manuscript.

Funding

Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL. We acknowledge financial support from the Open Access Publication Fund of UKE - Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf- and DFG – German Research Foundation.

Availability of data and materials

The datasets used and/or analysed during the current study are available from the corresponding author on reasonable request.

Declarations

Ethics approval and consent to participate

All patients gave written approval for the utilisation of their tissue samples and the reviewing of their medical records according to our investigational review board and ethics committee guidelines (Ethik-Kommission der Ärztekammer Hamburg, #OB/V/03). The animal study protocol was approved by the Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz of Freie und Hansestadt Hamburg (N005/2020; 12.03.2020).

Consent for publication

Not applicable.

Competing interests

The authors declare no conflict of interest concerning the presented analysis. IW received speaker's honoraria outside this work from Amgen, Astra Zeneca, Daiichi-Sankyo, Lilly, MSD, Novartis, Pierre Fabre, Pfizer, Roche, and Seagen. VM received speaker's honoraria from Amgen, Astra Zeneca, Daiichi-Sankyo, Eisai, GSK, Pfizer, MSD, Medac, Novartis, Roche, Teva, Seagen, Onkowissen, high5 Oncology, Medscape, Gilead, Pierre Fabre; consultancy honoraria from Hexal, Roche, Pierre Fabre, Amgen, ClinSol, Novartis, MSD, Daiichi-Sankyo, Eisai, Lilly, Sanofi, Seagen, Gilead; institutional research support from Novartis, Roche, Seagen, Genentech and travel grants from Roche, Pfizer, Daiichi Sankyo, Gilead. BS received speaker's honoraria, travel grants and consultancy honoraria as well as institutional research support outside this work from Eisai, Astra

Zeneca, MSD, Pfizer, Roche, GSK, Clovis, and Ethicon. The funders had no role in the design of the study; in the collection, analyses, or interpretation of data; in the writing of the manuscript, or in the decision to publish the results".

Author details

¹Department of Gynaecology, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Martinistraße 52, 20246 Hamburg, Germany. ²Goethe University, Frankfurt, Germany. ³Institute for Pathology, Department of Molecular Pathology, University of Basel, Basel, Switzerland. ⁴Institute of Neuropathology, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany. ⁵Institute of Tumor Biology, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany. ⁶Institute of Experimental Anatomy, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany. ⁷MSH Medical School of Hamburg, University of Applied Sciences and Medical University, Hamburg, Germany.

Received: 15 December 2022 Accepted: 9 March 2023

Published online: 16 March 2023

References

1. Torre LA, Siegel RL, Ward EM, Jemal A. Global cancer incidence and mortality rates and trends—an update. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 2016;25(1):16–27.
2. Hess KR, Varadachary GR, Taylor SH, Wei W, Raber MN, Lenzi R, et al. Metastatic patterns in adenocarcinoma. *Cancer.* 2006;106(7):1624–33.
3. Kenneke H, Yerushalmi R, Woods R, Cheang MC, Voduc D, Speers CH, et al. Metastatic behavior of breast cancer subtypes. *J Clin Oncol.* 2010;28(20):3271–7.
4. Laakkonen E, Witzel I, Fasching PA, Rezai M, Schem C, Solbach C, et al. Development of central nervous system metastases as a first site of metastatic disease in breast cancer patients treated in the neoadjuvant trials GeparQuinto and GeparSixto. *Breast Cancer Res.* 2019;21(1):60.
5. Wei S, Siegal GP. Metastatic organotropism: an intrinsic property of breast cancer molecular subtypes. *Adv Anat Pathol.* 2017;24(2):78–81.
6. Hanahan D, Weinberg RA. Hallmarks of cancer: the next generation. *Cell.* 2011;144(5):646–74.
7. Lambert AW, Pattabiraman DR, Weinberg RA. Emerging biological principles of metastasis. *Cell.* 2017;168(4):670–91.
8. Nguyen DX, Bos PD, Massague J. Metastasis: from dissemination to organ-specific colonization. *Nat Rev Cancer.* 2009;9(4):274–84.
9. Aceto N, Bardia A, Miyamoto DT, Donaldson MC, Wittner BS, Spencer JA, et al. Circulating tumor cell clusters are oligoclonal precursors of breast cancer metastasis. *Cell.* 2014;158(5):1110–22.
10. Cheung KJ, Ewald AJ. A collective route to metastasis: seeding by tumor cell clusters. *Science.* 2016;352(6282):167–9.
11. Giuliano M, Shaikh A, Lo HC, Arpino G, De Placido S, Zhang XH, et al. Perspective on circulating tumor cell clusters: why it takes a village to metastasize. *Cancer Res.* 2018;78(4):845–52.
12. Hou JM, Krebs MG, Lancashire L, Sloane R, Backen A, Swain RK, et al. Clinical significance and molecular characteristics of circulating tumor cells and circulating tumor microemboli in patients with small-cell lung cancer. *J Clin Oncol.* 2012;30(5):525–32.
13. Krol I, Schwab FD, Carbone R, Ritter M, Picoccia S, De Marni ML, et al. Detection of clustered circulating tumour cells in early breast cancer. *Br J Cancer.* 2021;125(1):23–7.
14. Jansson S, Bendahl PO, Larsson AM, Aaltonen KE, Ryden L. Prognostic impact of circulating tumor cell apoptosis and clusters in serial blood samples from patients with metastatic breast cancer in a prospective observational cohort. *BMC Cancer.* 2016;16:433.
15. Mu Z, Wang C, Ye Z, Austin L, Civan J, Hyslop T, et al. Prospective assessment of the prognostic value of circulating tumor cells and their clusters in patients with advanced-stage breast cancer. *Breast Cancer Res Treat.* 2015;154(3):563–71.
16. Wang C, Mu Z, Chervoneva I, Austin L, Ye Z, Rossi G, et al. Longitudinally collected CTCs and CTC-clusters and clinical outcomes of metastatic breast cancer. *Breast Cancer Res Treat.* 2017;161(1):83–94.
17. Follain G, Herrmann D, Harlepp S, Hyenne V, Osmani N, Warren SC, et al. Fluids and their mechanics in tumour transit: shaping metastasis. *Nat Rev Cancer.* 2020;20(2):107–24.
18. Cheung KJ, Padmanaban V, Silvestri V, Schipper K, Cohen JD, Fairchild AN, et al. Polyclonal breast cancer metastases arise from collective dissemination of keratin 14-expressing tumor cell clusters. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2016;113(7):E854–63.
19. Han HJ, Sung JV, Kim SH, Yun UJ, Kim H, Jang EJ, et al. Fibronectin regulates anoikis resistance via cell aggregate formation. *Cancer Lett.* 2021;508:59–72.
20. Saïas L, Gomes A, Cazales M, Ducommun B, Lobjois V. Cell-cell adhesion and cytoskeleton tension oppose each other in regulating tumor cell aggregation. *Cancer Res.* 2015;75(12):2426–33.
21. Delva E, Tucker DK, Kowalczyk AP. The desmosome. *Cold Spring Harb Perspect Biol.* 2009;1(2):a002543.
22. Garrod D, Chidgey M. Desmosome structure, composition and function. *Biochim Biophys Acta.* 2008;1778(3):572–87.
23. Harrison OJ, Brasch J, Lasso G, Katsamba PS, Ahlsen G, Honig B, et al. Structural basis of adhesive binding by desmocollins and desmogleins. *Proc Natl Acad Sci USA.* 2016;113(26):7160–5.
24. Lee YT. Breast carcinoma: pattern of metastasis at autopsy. *J Surg Oncol.* 1983;23(3):175–80.
25. Chang PH, Chen MC, Tsai YP, Tan GYT, Hsu PH, Jeng YM, et al. Interplay between desmoglein 2 and hypoxia controls metastasis in breast cancer. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2021;118(3): e2014408118.
26. Hutz K, Zeiler J, Sachs L, Ormanns S, Spindler V. Loss of desmoglein 2 promotes tumorigenic behavior in pancreatic cancer cells. *Mol Cancer.* 2017;56(8):1884–95.
27. Saunus JM, Quinn MC, Patch AM, Pearson JV, Bailey PJ, Nones K, et al. Integrated genomic and transcriptomic analysis of human brain metastases identifies alterations of potential clinical significance. *J Pathol.* 2015;237(3):363–78.
28. Fang WK, Liao LD, Li LY, Xie YM, Xu XE, Zhao WJ, et al. Down-regulated desmocollin-2 promotes cell aggressiveness through redistributing adherens junctions and activating beta-catenin signalling in oesophageal squamous cell carcinoma. *J Pathol.* 2013;231(2):257–70.
29. Kolegraff K, Nava P, Helms MN, Parkos CA, Nusrat A. Loss of desmocollin-2 confers a tumorigenic phenotype to colonic epithelial cells through activation of Akt/beta-catenin signaling. *Mol Biol Cell.* 2011;22(8):1121–34.
30. Fang WK, Liao LD, Zeng FM, Zhang PX, Wu JY, Shen J, et al. Desmocollin-2 affects the adhesive strength and cytoskeletal arrangement in esophageal squamous cell carcinoma cells. *Mol Med Rep.* 2014;10(5):2358–64.
31. Li K, Wu R, Zhou M, Tong H, Luo KQ. Desmosomal proteins of DSC2 and PKP1 promote cancer cells survival and metastasis by increasing cluster formation in circulatory system. *Sci Adv.* 2021;7(40): eabg7265.
32. Bos PD, Zhang XH, Nadal C, Shu W, Gomis RR, Nguyen DX, et al. Genes that mediate breast cancer metastasis to the brain. *Nature.* 2009;459(7249):1005–9.
33. Hamster F, Sturken C, Saygi C, Qi M, Legler K, Gorzelanny C, et al. Insights into the steps of breast cancer-brain metastases development: tumor cell interactions with the blood-brain barrier. *Int J Mol Sci.* 2022;23(3):1900.
34. Nehmann N, Wicklein D, Schumacher U, Muller R. Comparison of two techniques for the screening of human tumor cells in mouse blood: quantitative real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR) versus laser scanning cytometry (LSC). *Acta Histochem.* 2010;112(5):489–96.
35. Hvichia GE, Parveen Z, Wagner C, Janning M, Quidde J, Stein A, et al. A novel microfluidic platform for size and deformability based separation and the subsequent molecular characterization of viable circulating tumor cells. *Int J Cancer.* 2016;138(12):2894–904.
36. Alix-Panabieres C, Pantel K. Challenges in circulating tumour cell research. *Nat Rev Cancer.* 2014;14(9):623–31.
37. Lawson DA, Bhakta NR, Kessenbrock K, Prummel KD, Yu Y, Takai K, et al. Single-cell analysis reveals a stem-cell program in human metastatic breast cancer cells. *Nature.* 2015;526(7571):131–5.
38. Legan PK, Yue KKM, Chidgey MAJ, Holton JL, Wilkinson RW, Garrod DR. The Bovine Desmocollin Family—a new gene and expression patterns reflecting epithelial-cell proliferation and differentiation. *J Cell Biol.* 1994;126(2):507–18.
39. Hegazy M, Perl AL, Svoboda SA, Green KJ. Desmosomal cadherins in health and disease. *Annu Rev Pathol.* 2022;17:47–72.

40. Landemaine T, Jackson A, Bellahcene A, Rucci N, Sin S, Abad BM, et al. A six-gene signature predicting breast cancer lung metastasis. *Cancer Res.* 2008;68(15):6092–9.
41. Bryan S, Witzel I, Borgmann K, Oliveira-Ferrer L. Molecular mechanisms associated with brain metastases in HER2-positive and triple negative breast cancers. *Cancers.* 2021;13(16):4137.
42. Schuster E, Taftaf R, Reduzzi C, Albert MK, Romero-Calvo I, Liu H. Better together: circulating tumor cell clustering in metastatic cancer. *Trends Cancer.* 2021;7(11):1020–32.
43. Marrella A, Fedi A, Varani G, Vaccari I, Fato M, Firpo G, et al. High blood flow shear stress values are associated with circulating tumor cells cluster disaggregation in a multi-channel microfluidic device. *PLoS ONE.* 2021;16(1): e0245536.
44. Campenni M, May AN, Boddy A, Harris V, Nedelcu AM. Agent-based modelling reveals strategies to reduce the fitness and metastatic potential of circulating tumour cell clusters. *Evol Appl.* 2020;13(7):1635–50.
45. Reynolds DS, Tevis KM, Blessing WA, Colson YL, Zaman MH, Grinstaff MW. Breast cancer spheroids reveal a differential cancer stem cell response to chemotherapeutic treatment. *Sci Rep.* 2017;7(1):10382.
46. Breslin S, O'Driscoll L. The relevance of using 3D cell cultures, in addition to 2D monolayer cultures, when evaluating breast cancer drug sensitivity and resistance. *Oncotarget.* 2016;7(29):45745–56.
47. Desoize B, Jardillier J. Multicellular resistance: a paradigm for clinical resistance? *Crit Rev Oncol Hematol.* 2000;36(2–3):193–207.
48. Hapach LA, Carey SP, Schwager SC, Taufalele PV, Wang W, Mosier JA, et al. Phenotypic heterogeneity and metastasis of breast cancer cells. *Cancer Res.* 2021;81(13):3649–63.
49. Jiang F, Wu P. Regulating DSC2 expression affects the proliferation and apoptosis of prostate cancer cells. *Cancer Manag Res.* 2020;12:11453–62.

Publisher's Note

Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Ready to submit your research? Choose BMC and benefit from:

- fast, convenient online submission
- thorough peer review by experienced researchers in your field
- rapid publication on acceptance
- support for research data, including large and complex data types
- gold Open Access which fosters wider collaboration and increased citations
- maximum visibility for your research: over 100M website views per year

At BMC, research is always in progress.

Learn more biomedcentral.com/submissions



2. Zusammenfassende Darstellung der Arbeit

2.1. Einleitung

Das Mammakarzinom ist mit rund 2.3 Millionen Neuerkrankungen pro Jahr die häufigste Krebserkrankung der Frau weltweit (Stand 2020) (Sung et al. 2021). Allein in Deutschland werden pro Jahr etwa 70.000 Neuerkrankungen verzeichnet (Stand 2018). Auch Männer erkranken an Brustkrebs, mit circa 1% der Neuerkrankungen jedoch deutlich seltener als Frauen (Erdmann et al. 2021).

Trotz eines in den letzten Jahren verzeichneten Rückgangs der Inzidenz und der Mortalität stellt das Mammakarzinom weiterhin die führende Krebstodesursache der Frau dar (Katalinic et al. 2020, Erdmann et al. 2021, Sung et al. 2021). Insbesondere das metastasierte Mammakarzinom in Stadium IV der UICC-Klassifikation (Union for International Cancer Control) ist für einen Großteil der brustkrebsbedingten Todesfälle verantwortlich: Die 5-Jahres Überlebensrate beträgt circa 29% im Vergleich zu über 80% beim nicht-metastasierten Brustkrebs (Erdmann et al. 2021, Siegel et al. 2022). Obgleich in den letzten Jahren durch neue Therapiekonzepte eine Verbesserung des Langzeitüberlebens dieser Patientinnen verzeichnet werden konnte, kann das metastasierte Mammakarzinom bei Diagnosestellung noch immer meist nur in palliativer Intention therapiert werden (Caswell-Jin et al. 2018).

Die Metastasierung kann dabei noch viele Jahre nach dem eigentlichen Primärtumor auftreten und erfolgt sowohl lymphogen in lokoregionäre und nicht-regionäre Lymphknoten als auch hämatogen in Knochen, Leber, Lunge und Gehirn (Hess et al. 2006, Kennecke et al. 2010). Die Lokalisation der Metastasen wird beeinflusst von den vier verschiedenen molekularen Subtypen des Mammakarzinoms, die anhand des Hormonrezeptorstatus (Östrogenrezeptor (ER) und Progesteronrezeptor (PR)), des HER2/neu-Status und des Proliferationsmarkers Ki-67 unterteilt werden in Luminal-A und Luminal-B (beide Hormonrezeptor-positiv), HER2 (Hormonrezeptor-negativ und HER2/neu-positiv) sowie Triple-negativ (Hormonrezeptor- und HER2/neu-negativ) (Kennecke et al. 2010, Wei und Siegal 2017). Triple-negativ (TN)- und HER2-Subtyp sind dabei mit prognostisch ungünstigen Metastasierungsmustern assoziiert: Während Knochenmetastasen vorwiegend im Luminal-A- und -B-Subtyp und Lebermetastasen vor allem im HER2-Subtyp diagnostiziert werden, sind Hirn- und Lungenmetastasen hauptsächlich bei TN- und HER2-Typ-Mammakarzinomen zu beobachten (Kennecke et al. 2010, Wei und Siegal 2017, Laakmann et al. 2019). Insbesondere zerebrale Metastasen gehen mit

einer äußerst schlechten Prognose einher und führen zu einer drastischen Einschränkung der Lebenserwartung (Quigley et al. 2013, Saunus et al. 2015).

Die Metastasierung als solche ist ein mehrschrittiger Prozess, bei dem sich Tumorzellen vom Primärtumor oder - im späteren Verlauf von bestehenden Metastasen - lösen und in ferner gelegenen Organen Absiedlungen bilden (Fidler 2003). Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der „Metastasierungskaskade“: Zu Beginn steht die Migration und Invasion der Zellen in das umliegende Gewebe. Anschließend folgt die Intravasation der Tumorzellen in die Gefäße sowie das Überleben in der Zirkulation und zuletzt die Extravasation in das Parenchym (Hanahan und Weinberg 2011, Lambert et al. 2017). Hierbei kommt es entweder zum Übergang der Zellen in einen ruhenden Zustand oder zur Kolonisation mit Ausbildung von Mikro- und später Makrometastasen (Nguyen et al. 2009).

Die im Blutkreislauf zirkulierenden Tumorzellen, sogenannte *Circulating Tumor Cells* (CTCs), spielen eine Schlüsselrolle in der Metastasierung und wurden in dem Großteil solider Tumoren als negativer Prognosefaktor identifiziert. Die Anzahl der CTCs im Blutstrom ist dabei deutlich höher als die der tatsächlich entstehenden Metastasen, da das Überleben der CTCs in der Blutzirkulation eher gering ist (Bidard et al. 2014, Massagué und Obenauf 2016). Neben einzelnen CTCs wurden im Blut von Krebspatienten/-innen jedoch auch Zellverbände von bis zu 50 CTCs, sogenannte CTC Cluster, entdeckt (Hou et al. 2012, Aceto et al. 2014, Krol et al. 2021). Studien belegten, dass diese Cluster nicht durch intravaskuläre Aggregation von CTCs entstehen, sondern ihren Ursprung in sich vom Primärtumor lösenden Zellverbänden haben (Aceto et al. 2014, Cheung und Ewald 2016). CTC Cluster sind zwar deutlich seltener als einzelne CTCs, gehen aber im Vergleich mit einer 50- bis 100-fach höheren Wahrscheinlichkeit für Metastasen und dementsprechend einem signifikant schlechterem klinischen Outcome einher (Johansson et al. 2012, Aceto et al. 2014, Mu et al. 2015, Cheung et al. 2016, Wang et al. 2017). Es wird vermutet, dass der Schutz der Clusterformation zu einem verstärkten Überleben der CTCs in der Zirkulation führt (Hou et al. 2012, Follain et al. 2020, Schuster et al. 2021).

In diesem Zusammenhang wurde sich in der Forschung der letzten Jahre verstärkt den verschiedenen Adhäsionsmolekülen und deren Einfluss auf Tumorverbände und Metastasierungsprozesse gewidmet. Die zu den Adhäsionsmolekülen gehörende Superfamilie der Cadherine sind Ca^{2+} -abhängige transmembrane

Glykoproteine. Sie sind essentieller Bestandteil von Zell-Zell-Verbindungen, beeinflussen als solche auch die Morphogenese und Signaltransduktion und lassen sich in mehrere Untergruppen einteilen (Hegazy et al. 2022). Bislang wurde hauptsächlich die Bedeutung der klassischen Cadherine, insbesondere des E-Cadherins, in malignen Prozessen wie Tumorwachstum und Metastasierung genauer erforscht (Saias et al. 2015, Padmanaban et al. 2019). Eine bisher vernachlässigte Untergruppe sind die desmosomalen Cadherine, die in die Desmocolline 1 bis 3 (DSC1-DSC3) und Desmogleine 1 bis 4 (DSG1-DSG4) unterteilt werden (Legan et al. 1994).

Die desmosomalen Cadherine bestehen aus einer extrazellulären Domäne, die die Ca^{2+} -abhängige Bindung vermittelt, einer transmembranösen sowie einer intrazellulären Domäne. Während Desmogleine allgemein eine deutlich längere intrazelluläre Domäne als Desmocolline aufweisen, kommen letztere in zwei unterschiedlichen Splice-Varianten vor, wobei Variante b durch Fehlen eines Segments eine noch kürzere intrazelluläre Domäne als Variante a besitzt (Hegazy et al. 2022). Desmocolline und Desmogleine sind maßgeblich beteiligt am Aufbau der Desmosomen, auch Macula adhaerens genannt: Die Desmosomen sind eine Form der Zell-Zell-Kontakte, die für die Stabilisierung von Zellverbänden verantwortlich und daher essentiell für die Gewebeintegrität sind (Brooke et al. 2012). Diese fleckförmigen Verbindungen kommen vor allem in mechanisch stark beanspruchten Geweben vor wie Epithelien und Myokard. In Desmosomen binden Desmocolline beziehungsweise Desmogleine über ihre extrazelluläre Domäne die desmosomalen Cadherine benachbarter Zellen, während sie über ihre intrazelluläre Domäne mit desmosomalen Plaque-Proteinen wie Plakoglobin und Plakophilin, Mitgliedern der Armadillo-Proteinfamilie, verbunden sind. Diese wiederum interagieren mit Desmoplakin, einem Mitglied der Plakin-Proteinfamilie, das mit den Intermediärfilamenten der Zelle verbunden ist (Garrod und Chidgey 2008, Delva et al. 2009, Brooke et al. 2012) (siehe Abbildung 1).

Desmocolline und Desmogleine formen auf diese Weise homophile und heterophile Bindungen miteinander (Garrod und Chidgey 2008, Harrison et al. 2016). Die verschiedenen desmosomalen Cadherine bzw. deren Isoformen sind dabei je nach Gewebeart in unterschiedlicher Zusammensetzung vertreten.

DSC2 ist eine der weitverbreitesten Desmocollin-Isoformen im Körper und wird neben DSG2 als einzige Isoform im Myokard exprimiert (Brooke et al. 2012, Hegazy

et al. 2022). In Zusammenhang mit Pathologien wird DSC2 vor allem assoziiert mit der arrhythmogenen rechtsventrikulären Kardiomyopathie, bei der unter anderem DSC2-Mutationen zu einem fett- und bindegewebigen Umbau des Myokards führen (Heuser et al. 2006, Beffagna et al. 2007).




Abbildung 1: Schematischer Aufbau der Desmosomen. (mit Genehmigung des John Wiley & Son Verlag modifiziert aus Waschke und Spindler 2014).

In den letzten Jahren rückten in der Tumorforschung die desmosomalen Proteine jedoch vermehrt in den Fokus der Aufmerksamkeit, wobei für die verschiedenen Tumorentitäten sowohl tumorfördernde als auch tumorhemmende Effekte in der Literatur nachgewiesen wurden: Beispielsweise führte ein DSC2-Knockdown über Aktivierung des Akt-/Catenin-Signalwegs zu einem verstärkten Wachstum kolorektaler Karzinomzellen (Kolegraff et al. 2011). Aceto et al. wiederum konnten im Mausmodell einen Zusammenhang zwischen hoher Plakoglobin-Expression und der vermehrten Bildung von CTC Clustern und Lungenmetastasen zeigen (Aceto et al. 2014). Ferner wurde kürzlich berichtet, dass DSG2 in Patientinnen mit Brustkrebs mit einer schlechten Prognose assoziiert und insbesondere bedeutend ist für CTC Clusterbildung und Metastasierung (Chang et al. 2021).

Ausgangspunkt dieser Arbeit waren die im gynäkologischen Forschungslabor durchgeführten Untersuchungen von Tumorproben metastasierter und nicht-metastasierter Mammakarzinome, die das desmosomale Protein DSC2 als einen prädisponierenden Faktor für einen Krankheitsprogress bei Brustkrebs und die Metastasenbildung identifizierten. Analysen von Microarray-Daten zeigten einen

signifikanten Zusammenhang zwischen hohen DSC2 mRNA-Leveln und dem HER2/neu- sowie dem TN-Subtyp, den beiden aggressivsten Subtypen des Mammakarzinoms. Weiterhin wurde eine signifikante Korrelation der hohen DSC2 mRNA-Level mit dem Auftreten von Hirn- und Lungenmetastasen nachgewiesen. Die Untersuchungen ergaben außerdem einen signifikanten Zusammenhang zwischen hohen DSC2 mRNA-Leveln und kürzerem Gesamtüberleben sowie reduziertem krankheitsfreien Überleben, vor allem in der Gruppe der TN- und HER2-positiven Patientinnen. Zusätzlich durchgeführte Western Blots und immunhistochemische Färbungen von DSC2 in Mammakarzinomproben auf Tissue Microarrays konnten die signifikant erhöhte DSC2-Expression in den HER2- und TN-Subtypen bestätigen. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit Studien, die DSC2 einerseits in verschiedenen Tumorentitäten als potentiellen Marker für Hirnmetastasen identifizierten und andererseits im Mammakarzinom als potentiellen Marker für Lungenmetastasen (Landemaine et al. 2008, Saunus et al. 2015).

2.2. Zielsetzung der Arbeit

Das Ziel dieser Doktorarbeit war es, basierend auf den oben genannten neu gewonnenen Erkenntnissen die Rolle von DSC2 in primärem Brustkrebs und in der Entwicklung von Metastasen, insbesondere Hirnmetastasen, auf mRNA- und Protein-Level genauer zu untersuchen. Bislang sind in der Literatur nur wenige Studien zu den Auswirkungen von DSC2 auf das Tumorzellverhalten und die Metastasierung zu finden. Im Rahmen dieser Promotion sollten deshalb mittels verschiedener Assays *in vitro* der Effekt der DSC2-Expression auf zelluläre Eigenschaften untersucht werden, um Rückschlüsse auf mögliche Mechanismen zu ziehen, über die DSC2 maligne Prozesse beeinflusst. Ein besonderer Fokus lag dabei angesichts jüngster Studien wie Aceto et al. auf den Einfluss von DSC2 bei der Entstehung von CTC-Clustern. Ausgehend von den zuvor erhobenen Daten hinsichtlich der DSC2-Expression bei verschiedenen Subtypen lag der Fokus dabei auf Triple-negativem Brustkrebs.

2.3. Methodik

2.3.1. Kultivierte Zelllinien, stabile Transfektion und Versuche im 2D-Modell

Unsere Experimente erfolgten primär in der Zellkultur. Dafür wurden die Triple-negativen Zelllinien MDA-MB231 und deren hirnmetastasierende Subzelllinie MDA-MB231-BR ausgewählt und mittels lentiviraler Transduktion jeweils eine DSC2-Überexpression beziehungsweise ein DSC2-Knockdown erzeugt. Zur Generierung des DSC2-Knockdowns in der MDA-MB231-BR Zelllinie wurden fünf verschiedenen

DSC2-spezifischen shRNA-Sequenzen sowie einer scramble shRNA control-Sequenz getestet. Für die DSC2-Überexpression in die MDA-MB231 Zelllinie wurde der LeGO-iC2-Puro+-Plasmid, in den mittels Restriktionsenzymen die DSC2 cDNA-Sequenz geklont wurde, verwendet. Als Kontrolle diente der entsprechende Leervektor. Nach Pyromycin-Selektion wurde die stabile Transfektion initial sowie im Verlauf durch Bestimmung des DSC2 mRNA-Levels mittels RNA-Isolation und anschließender qRT-PCR sowie auf Proteinebene mittels Western Blot jeweils nach einem etablierten Protokoll geprüft. Die Visualisierung der DSC2-Expression in der Immunfluoreszenz erfolgte ebenfalls nach Laborprotokoll (siehe Publikation).

Die Zellproliferation wurde über die Messung der metabolischen Aktivität der Zellen mittels XTT mit dem Cell Proliferation Kit (XTT) (Roche Applied Science, Mannheim, Germany) nach Herstellerinstruktionen untersucht. Die Zytotoxizitätsanalyse der MDA-MB231-BR Zelllinie und deren transfizierten Subzelllinien erfolgte durch Behandlung der Zellen mit Cisplatin in verschiedenen Konzentrationen für 48 Stunden und anschließender FACS-Analyse mit Annexin-V und Propodiumiodid (PI) – zur quantitativen Bestimmung der apoptotischen und nekrotischen Zellen. Da die DSC2-Überexpressions- und Kontroll-MDA-MB231 Zelllinien durch Verwendung des LeGO-iC2-Puro+-Plasmids, das die für das mCherry-Protein kodierende Sequenz beinhaltet, von sich aus rot fluoreszieren, wurde die Zytotoxizität stattdessen über die Verwendung des Cell Proliferation Kit (XTT) untersucht. Für die Analyse der Zellmigration wurde das OrisTM Universal Cell Migration Kit (Platypus Technologies, Madison, WI) nach Herstellerangaben verwendet: Dabei wurde ein initial zellfreies Areal und dessen Flächenreduktion durch Zellmigration mittels des ImageJ Wound Healing Tool (Wayne Rasband, National Institute of Health) untersucht. Die Zellinvasion wurde nach dem gleichen Schema jedoch unter Verwendung von basalmembranartiger Matrix (Matrigel®) analysiert. Die genaue Durchführung der genannten Experimente erfolgte wie in der Publikation beschrieben (siehe Publikation).

2.3.2. Multizelluläre Tumorsphäroide und Dissoziationsversuch

Die Zellen wurden auf mit 2%-iger Agarose beschichteten 96-Well-Platten ausgesät (5×10^3 Zellen/ 200ul Medium/ Well). Um die Sphäroidbildung der Zellen zu untersuchen, wurden die Sphäroide zuerst nach 24 Stunden und anschließend jeden zweiten Tag unter dem Lichtmikroskop untersucht und fotografiert (Axiovert 40 C, Carl Zeiss AG, Leica DFC320, Wetzlar, Germany). Im Dissoziationsversuch wurden

die Sphäroide jeweils fünf Mal auf- und abpipettiert und die Auswirkung auf die Formation direkt verglichen sowie fotografisch dokumentiert. Jede Zelllinie wurde in vierfacher Ausführung ausgesät.

2.3.3. Immunhistochemische Färbungen und Chemosensitivität im 3D-Modell

Die Chemosensitivität im 3D-Modell wurde zuerst an den - wie oben beschrieben - auf Agarose generierten Sphäroiden untersucht, die an Tag 3 mit Cisplatin in zwei unterschiedlichen Konzentrationen, jeweils 10uM und 50uM, für 48 Stunden behandelt wurden. Die Zellviabilität wurde durch den Nachweis von zellulärem ATP mittels des CellTitre-Glo® 3D-Assay (Promega) nach Herstellerinstruktionen bestimmt und die relative Lebensfähigkeit jeder behandelten Probe wurde im Verhältnis zur unbehandelten Kontrolle berechnet, die auf 1 gesetzt wurde.

Für die Bewertung der Zytotoxizität im polyHEMA-Modell und die Färbung von DSC2 wurden die Zelllinien in mit polyHEMA beschichteten T75 Flaschen ausgesät (zwei T75 pro Zelllinie, 2×10^6 Zellen / 12ml Medium / T75) und für die Sphäroidformation 72 Stunden kultiviert. Die Chemosensitivität von Sphäroiden wurde über die Färbung von Cisplatin-DNA-Addukten und phosphoryliertem Histon H2A.X (γ H2A.X), einem etablierten Marker für DNA-Doppelstrangbrüche, untersucht. Hierfür erfolgte zusätzlich die Inkubation der generierten Sphäroide mit Cisplatin in einer finalen Konzentration von 50 μ M für jeweils 8 und 24 Stunden. Nach Sphäroidkultivierung erfolgte die Fixierung der Zellen in Formalin, Einbettung in 2%-igen Agar und Einbettung in Paraffin. Für den DSC2- und Histon H2A.X-Nachweis wurden FFPE („Formalin-fixed and paraffin-embedded“)-Schnitte im Steamer (Zitratpuffer (pH 6.0) bei 125°C für 4 Minuten beziehungsweise S1699 (pH 6.0, DAKO) bei 121°C für 10 Minuten) vorbehandelt und als Primärantikörper mit anti-DSC2- (1:25 HPA011911, Atlas Antibodies, Sigma-Aldrich, Hamburg, Germany) oder anti- γ H2A.X-Antikörper (1:10,000; ab81299, abcam, Berlin, Germany) eine Stunde bei Raumtemperatur (RT) inkubiert. Es folgte die Inkubation mit Biotin-markiertem Schwein-anti-Hase Sekundärantikörper (verdünnt 1:200 in TBS, E0353, DAKO, Glostrup, Denmark) für 30 Minuten bei RT, anschließend die eigentliche Detektion durch Vectastain® ABC-AP Kit (Vector Laboratories, Burlingame, CA USA) und die Visualisierung mit Permanent Red (K0640, DAKO, Glostrup, Denmark). Für die Färbung der Cisplatin-DNA-Addukte (PT-GG-Färbung) wurden die Schnitte mit Fast Enzyme vorbehandelt (5 Minuten, RT, (ZUC059-015, Zytomed, Berlin, Germany)) und mit monoklonalem Ratten PT-GG-Antikörper für 80 Minuten inkubiert (1:1000, Oncolyze, Essen,

Germany). Im Anschluss fand die Inkubation mit Biotin-konjugiertem Kaninchen-anti-Ratte Sekundärantikörper statt (30 Minuten, RT, 1:100 verdünnt in TBS, 312-065-048, JacksonImmuno Research, Ely, UK). Die Visualisierung wurde mittels Streptavidin-konjugierter Alkalischer Phosphatase und Chromogen RED unter Verwendung des DAKO RealTM Detektionssystems (K5005, DAKO, Glostrup, Denmark) nach Herstellerangaben durchgeführt. Die Negativkontrollen für die Primärantikörper aller drei Färbungen sind der Publikation zu entnehmen.

Alle Schnitte wurden mit Hämatotoxylin gegengefärbt und mittels des Axio Scan.Z1 (Zeiss, Jena, Germany) eingescannt. Bilder wurden mit der netScope Viewer Pro Software (Version 1.0.7079.25167, NetBase Software GmbH, Freiburg, Germany) erstellt. Für die Quantifizierung der Histon- und Cisplatin-DNA-Addukt-Färbung wurden positiv gefärbte Zellen mithilfe des *Assistant electronic memory Counter AC-15* (Karl Hecht Assistant, Altnau; Switzerland) manuell ausgezählt (4x100 Zellen in vier verschiedenen Arealen).

2.3.4. Statistische Auswertung

Die statistische Auswertung der Experimente erfolgte - wie in der Publikation ausführlich beschrieben - zum Großteil mittels SPSS Statistics Version 25 (IBM, Armonk, NY, USA). Die statistische Analyse wurde mittels des ungepaarten, zweiseitigen t-Tests durchgeführt, wobei die Voraussetzung der Normalverteilung und der Varianzenhomogenität zuvor mithilfe von entsprechenden Tests überprüft wurde. In allen Versuchen wurde ein Signifikanzniveau von $p<0,05$ festgelegt.

2.4. Ergebnisse und Diskussion

2.4.1. DSC2-Überexpression und DSC2-Knockdown in TNBC Zelllinien

Für die Induktion des DSC2-Knockdowns wurde die MDA-MB231-BR Zelllinie ausgewählt, die im Vergleich zur Ursprungszelllinie MDA-MB231 endogen mehr DSC2 exprimiert. Für die weiteren Versuche wurden zwei DSC2 shRNA-Sequenzen ausgewählt, die zum stärksten Knockdown - nämlich shRNA III mit einem 70%-igen und shRNA V mit einem 60%-igen Knockdown auf mRNA-Ebene – führten. Per Western Blot konnte ebenfalls ein DSC2-Knockdown in den shRNA III und V Zelllinien bestätigt. Die DSC2-Überexpression wurde in der Ursprungszelllinie MDA-MB231 Zelllinie generiert. Hier zeigte sich sowohl mittels qRT-PCR als auch im Western Blot eine starke und stabile DSC2-Überexpression in den mit dem LeGO-iC2 DSC2-Vektor transduzierten Zellen verglichen mit den Zellen, die mit dem Leervektor transduziert wurden. Beide Zelllinien (Leervektor und DSC2-

Überexpression) wurden in den weiteren Versuchen verwendet. Weiterhin wurde die membranöse Lokalisation von DSC2 in den gentechnisch veränderten MDA-MB231 und MDA-MB231-BR Zellen mittels Immunofluoreszenz qualitativ dargestellt sowie mittels Durchflusszytometrie quantifiziert.

2.4.2. Zellkulturexperimente im 2D-Modell

Der Einfluss von DSC2 auf grundlegende Zelleigenschaften sowie auf die Chemosensitivität in der 2D-Zellkultur wurde als nächstes analysiert.

Im Proliferationsassay (XTT) zeigten sich keine signifikanten Unterschiede in der Zellproliferation zwischen den Zellen mit DSC2-Überexpression und der Kontrolle zu den verschiedenen Zeitpunkten (0, 24, 48 und 72 Stunden). Bei den DSC2-Knockdown Zellen wurde einzig nach 72 Stunden ein signifikanter Proliferationsanstieg in den shRNA III DSC2-Knockdown verglichen mit den MDA-MB231-BR scramble Zellen gemessen. Dieses Ergebnis zeigte sich jedoch nur in einem von drei Experimenten und war somit nicht reproduzierbar, sodass davon auszugehen ist, dass die Proliferation in der 2D-Zellkultur auch bei der MDA-MB231-BR Subzelllinie nicht durch ein verändertes DSC2-Expressionslevel beeinflusst wurde (siehe Abbildung 4 der Publikation).

Bei der Untersuchung der Zytotoxizität durch Cisplatin unterschieden sich die MDA-MB231-BR Zellen mit DSC2-Knockdown in der mittels Annexin-V/PI-Färbung ermittelten Anzahl der apoptotischen und nekrotischen Zellen nicht signifikant von den MDA-MB231-BR Kontrollzellen. Auch die Untersuchung der mit Cisplatin behandelten DSC2-Überexpression und der dazugehörigen Kontrollzelllinie mittels XTT-Assay erbrachte keine signifikanten Unterschiede.

Unsere Versuche ergaben also, dass eine Änderung der DSC2-Expression weder die Zellproliferation noch die Chemosensitivität unter 2D-Zellkulturbedingungen beeinflusst. Sie unterscheiden sich somit von einigen Studien, die eine deutliche, jedoch teils tumorfördernde, teils tumorhemmende Wirkung von DSC2 auf die 2D-Proliferation und 2D-Chemosensitivität bei verschiedenen Karzinomen beschrieben haben (Kolegraff et al. 2011, Jiang und Wu 2020). Es ist daher zu vermuten, dass die Bedeutung von DSC2 tumorentitäts- beziehungsweise - wenn man unsere neusten Ergebnisse berücksichtigt - Subtypen-spezifisch ist und sich daher nicht ohne weiteres vergleichen lässt.

Bei der Analyse der Zellmigration im *wound healing assay* führte ein DSC2-Knockdown - im shRNA III Klon - zu einer signifikant, jedoch geringfügig schnelleren

Migration der Zellen und somit zu einem vorzeitigen Verschluss der Wundfläche. Passend dazu, zeigte die DSC2-Überexpression im Vergleich zu den MDA-MB231 Kontrollzellen eine signifikant langsamere Zellmigration und somit langsameren Wundschluss. Bei der Durchführung des *wound healing assays* mit Matrigel® konnte eine mit dem Migrationsverhalten übereinstimmende Zellinvasion beobachtet werden (siehe Abbildung 4 der Publikation). Wir konnten also einen signifikanten, wenn auch nur geringfügigen Effekt von DSC2 auf die Migrations- und Invasionsfähigkeit der Zellen nachweisen, der sich allerdings mit Ergebnissen anderer Studien zu Migration und Adhäsionsproteinen deckt (Chang et al. 2021, Hapach et al. 2021).

2.4.3. Zellkulturexperimente im 3D-Modell

Im Anschluss an die Experimente in der 2D-Zellkultur wurden die Auswirkungen der veränderten DSC2-Expression mithilfe von Tumorsphäroiden im 3D-Modell erforscht, da dies die *in vivo*-Bedingungen deutlich besser widerspiegelt (Breslin und O'Driscoll 2016).

2.4.3.1. Zellverhalten im 3D-Modell

Bei der Sphäroidformation auf Agarose waren in den Tagen nach Zellaussaat bei den MDA-MB231-BR Zellen mit DSC2-Knockdown (shRNA III) deutlich aufgelockerte und dadurch größere Sphäroide im Vergleich zu den Kontrollzellen (scramble) zu beobachten, während der schwächere DSC2-Knockdown im shRNA V Klon eher den Kontrollzellen ähnelte. Die stark reduzierte Kompaktheit der Zellverbände mit DSC2-Knockdown (shRNA III) bestätigte sich im Dissoziationsversuch: Bei den Zellen mit DSC2-Knockdown (shRNA III) ermöglichte langsames Auf- und Abpipettieren der Sphäroide eine komplette mechanische Disaggregation zu einzelnen Zellen und wenigen, sehr kleinen Zellgrüppchen, während die Kontrollzellen nach der gleichen Prozedur in mehrere Zellgruppen zerteilt wurden, die sich teilweise über die Zeit wieder miteinander verbanden (siehe Abbildung 2).

Auffallend war, dass die MDA-MB231 Zellen mit DSC2-Überexpression dabei kleine und kompakte Sphäroide bildeten, deren Erscheinungsbild aber erstaunlicherweise keinen Unterschied zu den MDA-MB231 Zellen mit Leervektor (MDA-MB231 LeGO-iC2) zeigte. Die Sphäroide beider Zelllinien unterschieden sich mit ihrem verstärkten zellulären Zusammenhalt, der bei dem Versuch der mechanischen Disaggregation bestätigt wurde, jedoch deutlich von denen des MDA-MB231 Wildtyps (WT). Eine vergleichende Bestimmung des DSC2 mRNA-Levels der drei Zelllinien bestätigte zwar die deutliche DSC2-Überexpression in den MDA-MB231 LeGO-iC2 DSC2

Zellen gegenüber den MDA-MB231 LeGO-iC2 Zellen (Leervektor), ergab aber auch eine DSC2-Hochregulierung in den LeGO-iC2 Zellen gegenüber den Wildtyp-Zellen. Diese unspezifische, vermutlich transfektionsbedingte DSC2-Deregulierung im Leervektorzellen könnte eine Erklärung für die phänotypisch der DSC2-Überexpression ähnelnden Sphäroide sein. Daher wurde in den weiteren Versuchen stets der MDA-MB231 Wildtyp als Kontrollzelllinie mitanalysiert.




Abbildung 2: Einfluss der Desmocollin 2 (DSC2)-Expression auf den Zellverband im 3D-Modell. **a:** Tumorsphäroide der MDA-MB231-BR Scramble Kontrollzelllinie (Scramble) und des dazugehörigen MDA-MB231-BR DSC2-Knockdowns (shRNA III) sowie der Zelllinie MDA-MB231 Wildtyp (WT) und der dazugehörigen MDA-MB231 DSC2-Überexpression (LeGO-iC2 DSC2) auf Agarose an Tag 9. **b:** Tumorsphäroide nach mechanischer Disaggregation.

Im nächsten Schritt wurden die verschiedenen Zelllinien zur Bildung von Zellaggregaten in Suspension auf mit polyHEMA beschichteten Zellkulturflaschen kultiviert. Analog der Sphäroidformation im Agarose-Modell bildeten die MDA-MB231-BR Zellen mit DSC2-Knockdown (shRNA III) hier kaum und nur kleine Zellaggregate im Gegensatz zu den scramble Kontrollzellen. Die MDA-MB231 Zellen mit DSC2-Überexpression - genauso wie die Zellen mit Leervektor - aggregierten im Vergleich zu den WT Kontrollzellen in kurzer Zeit so stark, dass sich große, dichte und zellreiche Aggregate bildeten, die sich zu immer größeren Gruppen vereinigten.

Mittels immunhistochemischer Detektion von DSC2 wurde anschließend dessen veränderte Expression direkt in den auf polyHEMA gebildeten Zellaggregaten der Zelllinien MDA-MB231 DSC2-Überexpression und MDA-MB231-BR DSC2-Knockdown verglichen mit den jeweiligen Kontrollzelllinien nachgewiesen.

Unsere Versuche belegen also, dass eine DSC2-Hochregulierung zu einer verstärkten Aggregationsfähigkeit und in der Folge kompakten und zellreichen dreidimensionalen Clustern führt, während eine Reduktion der DSC2 Expression in lockeren und leicht dissoziierbaren Zellaggregaten resultiert. Es ist daher anzunehmen, dass eine DSC2-Hochregulierung auch im Blutkreislauf zu einer verstärkten Clusterbildung von CTCs beiträgt und damit zu einem höheren Potential der Tumorzellen zur Metastasenbildung (Aceto et al. 2014). Basierend auf der jüngeren Literatur wird vermutet, dass das so deutlich höhere metastatische Potential der CTC Cluster verglichen mit solitären CTCs unter anderem auf eine erheblich höhere Überlebenswahrscheinlichkeit der Clusterzellen in der Blutbahn zurückzuführen ist: Mehrere Studien berichten von morphologischen Merkmalen der Apoptose in Einzel-CTCs, aber nicht in CTC Clustern (Hou et al. 2012, Mu et al. 2015, Giuliano et al. 2018, Schuster et al. 2021). Dies ist vermutlich auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Beispielsweise wurde kürzlich festgestellt, dass Scherkräfte das Überleben von CTCs *in vitro* reduzieren und CTC Cluster deutlich resistenter gegenüber Scherstress sind als einzelne CTCs, wobei steigende Scherstress-Level die Cluster schrittweise aufspalten (Marrella et al. 2021). Eine andere Studie zeigte, dass Zellen, die sich *in vitro* resistent gegenüber Scherkräften zeigten, erheblich mehr DSC2 und Plakophilin-1 exprimierten und vermehrt Zell-Cluster bildeten (Li et al. 2021). Zudem gingen eine erhöhte Dichte und Größe von CTC Clustern *in vitro* mit einer gesteigerten Überlebensrate der Clusterzellen einher (Campenni et al. 2020).

2.4.3.2. Chemosensitivität im 3D-Modell

Neben der erhöhten Widerstandsfähigkeit könnte der Zellzusammenhalt der CTC Cluster die Chemosensitivität beeinflussen und so einen Überlebensvorteil gegenüber solitären CTCs schaffen.

Um zu untersuchen, inwiefern die unterschiedliche Beschaffenheit der 3D-Zellkonstrukte Auswirkungen auf die Medikamentendiffusion und somit die Chemosensitivität hat, wurden zunächst die auf Agarose gebildeten Sphäroide für 48 Stunden mit Cisplatin behandelt. Im Vergleich zu den unbehandelten

Kontrollsphäroiden führte eine Behandlung mit 50µM Cisplatin bei den MDA-MB231 Sphäroiden mit DSC2-Überexpression zu einem deutlich aufgelockerten Randbereich bei weiterhin kompaktem Kernbereich, während die gleiche Cisplatin-Konzentration bei den MDA-MB231 Wildtyp Sphäroiden zu einer Auflockerung des gesamten Sphäroids führte. Bei den lockeren Sphäroiden mit DSC2-Knockdown (shRNA III) war mikroskopisch kein eindeutiger Effekt sichtbar. Der Versuch, mittels CellTiter-Glo®3D-Assay die Lebensfähigkeit der Sphäroidzellen zu quantifizieren, erbrachte leider keine reproduzierbaren und teilweise widersprüchliche Ergebnisse. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass die Kompaktheit der Sphäroide mit DSC2-Überexpression ein Durchdringen des CellTiter-Glo® Reagenz in den Kernbereich der Sphäroide verhinderte und so die Messergebnisse verfälschte.

Um die Auswirkungen von Cisplatin auf die 3D-Zellkonstrukte genauer zu analysieren, wurde die Chemosensitivität deshalb zusätzlich am polyHEMA-Modell untersucht. Hierfür wurden die auf polyHEMA generierten Zellaggregate für jeweils 8 und 24 Stunden mit Cisplatin behandelt. Die durch Cisplatin vorwiegend gebildeten DNA-*Intrastrang-Crosslinks* sowie die Cisplatin-vermittelte Zellzytotoxizität wurden über immunhistochemische Färbung von PT-GG-Addukten beziehungsweise phosphoryliertem Histon H2A.X bestimmt. Hier konnten wir beobachten, dass die kleinen MDA-MB231-BR Zellcluster mit DSC2-Knockdown (shRNA III) - insbesondere nach 8 Stunden dauernder Behandlung mit Cisplatin - in beiden Färbungen stärker und intensiver gefärbt waren als die scramble Kontroll-Zellcluster, während die großen und kompakten MDA-MB231 Zellcluster mit DSC2-Überexpression erheblich schwächer angefärbt waren als die MDA-MB231 Wildtyp Zellcluster.

Die Quantifikation durch manuelle Auszählung positiv gefärbter Zellen ergab in beiden Färbungen eine signifikant höhere Anzahl an Platin-Addukten und γH2A.X-positiven Zellen in der MDA-MB231 Zelllinie mit DSC2-Knockdown (shRNA III) verglichen mit der scramble Kontrollzelllinie sowie eine signifikant niedrigere Anzahl in der MDA-MB231 Zelllinie mit DSC2-Überexpression im Vergleich zur MDA-MB231 Wildtyp Zelllinie (siehe Abbildung 3).




Abbildung 3: Einfluss der Desmocollin 2 (DSC2)-Expression auf die Chemosensitivität im 3D-Modell. **a:** Immunhistochemische Färbung von phosphoryliertem Histon H2AX (*yH2AX*) der MDA-MB231-BR Scramble Kontrollzelllinie (*Scramble*) und des dazugehörigen MDA-MB231-BR DSC2-Knockdowns (*shRNA III*) sowie der Zelllinie MDA-MB231 Wildtyp (*WT*) und der dazugehörigen MDA-MB231 DSC2-Überexpression (*LeGO-iC2 DSC2*) nach Behandlung mit Cisplatin über 8 Stunden auf polyHEMA. **b:** Quantifizierung der *yH2AX*-positiven Zellen mittels manueller Auszählung nach 8 und 24 Stunden (** = p < 0,001).

Wir konnten somit demonstrieren, dass der Zellzusammenhalt von Zellclustern die Chemosensitivität beeinflusst: Eine vermehrte DSC2-Expression bedingt niedrigere Apoptoseraten, während eine verminderte DSC2-Expression ein deutlich stärkeres Ansprechen auf Cisplatin bewirkt. Unsere Ergebnisse stimmen damit mit Studien der letzten Jahre überein, die beobachteten, dass die Bildung von CTC Clustern, insbesondere solchen mit hoher Dichte, zu einer reduzierten Chemosensitivität und somit einem Überlebensvorteil im Vergleich zu Einzel-CTCs führt (Hou et al. 2012, Reynolds et al. 2017, Campenni et al. 2020). Weiterhin ist anzunehmen, dass die verstärkten Zell-Zell-Interaktionen in CTC Clustern vermehrte Überlebenssignale und dadurch eine verstärkte Resistenz gegenüber Anoikis bewirken, einer Form der Apoptose, die auf den Verlust von Zell-Zell- und Zell-Matrix-Kontakten

zurückzuführen ist (Hou et al. 2012). Beispielsweise konnten Han et al. zeigen, dass ein Knockdown desmosomaler Proteine wie DSC2, DSG2 und Plakophilin neben einer beeinträchtigten Zellaggregation zu einer verminderten Anoikis-Resistenz *in vitro* führte; die Expressionslevel der desmosomalen Proteine korrelierten bei Brustkrebspatientinnen hingegen negativ mit dem Gesamtüberleben (Han et al. 2021). Auch eine heterogene Clusterbildung mit Immunzellen wie Makrophagen oder Leukozyten trägt vermutlich zu einem verstärkten Überleben der CTC Cluster im Vergleich zu den Einzel-CTCs bei (Schuster et al. 2021).

Es ist durchaus denkbar, dass durch eine DSC2-Hochregulierung auch der Primärtumor als solcher kompakter wird oder es zur Bildung von Tumorclustern innerhalb des Tumorverbands kommt. Solche Tumorinseln könnten nicht nur die Chemosensitivität des Primärtumors, sondern auch den Metastasierungsprozess beeinflussen. Hier könnte man Versuche anschließen, die die Beschaffenheit beziehungsweise Zusammensetzung von Tumoren mit erhöhter DSC2-Expression *in vivo* untersuchen.

2.4.4. Weitere Versuche

Ein von uns durchgeführter Versuch, in Hydrogel kultivierte Zellcluster mit veränderter DSC2-Expression mittels Immunfluoreszenz zu färben, um Unterschiede in deren dreidimensionaler Struktur und der Ausbreitung im Raum zu analysieren, erbrachte leider keine aufschlussreichen Ergebnisse. Weiterführende Studien mit optimierten Versuchsbedingungen wären hier wünschenswert, um diesem Ansatzpunkt weiter nachzugehen.

Um das Verhalten der DSC2-Knockdown Zellen als CTCs *in vivo* zu untersuchen, wurden im Anschluss an diese Arbeit Mausversuche durchgeführt, in denen nach intrakardialer Injektion von MDA-MB231-BR DSC2 shRNA III Zellen beziehungsweise MDA-MB231-BR DSC2 scramble Zellen die Metastasenbildung beobachtet wurde. Hierbei führte ein DSC2-Knockdown zu weniger CTCs und CTC Clustern im Blut und in der Folge zu weniger und kleineren Hirnmetastasen sowie zu einer geringeren Menge an etablierten Lungenmetastasen im Vergleich zu den Kontrollzellen. Diese Beobachtungen bekräftigen unsere *in vitro*-Ergebnisse, wobei die geringe Größe der Mausgruppen bei fehlender Signifikanz keine konkreten Schlussfolgerungen erlaubten. Im Rahmen von zukünftigen Studien wäre es interessant, die Ergebnisse unseres *in vivo*-Modells in größer angelegten Mausversuchen zu vertiefen. Des Weiteren könnte die Stressresistenz der Sphäroide

mit unterschiedlicher DSC2-Expression in *in vitro*-Modellen, welche die Scherkräfte des Blutkreislaufs simulieren, getestet werden.

2.5. Fazit

Mit dieser experimentellen Arbeit konnten wir den tumorbegünstigenden Einfluss von DSC2 im Mammakarzinom durch *in vitro*-Experimente mit zwei Triple-negativen Zelllinien nachweisen: Eine erhöhte DSC2-Expression führte in der 3D-Zellkultur zu einer verstärkten Zellaggregationsfähigkeit und einer erhöhten Resistenz der dreidimensionalen Zellaggregate gegenüber Chemotherapeutika - dies resultiert in einer vermehrten Bildung und einem verstärkten Überleben von CTC Clustern mit bekanntlich höherem metastatischen Potential.

Unsere Ergebnisse könnten somit den Ausgangspunkt für weiterführende Studien bilden, um das Potential von DSC2 als prognostischen Marker im klinischen Setting - insbesondere als Marker für Hirn- und Lungenmetastasen beim Triple-negativen Mammakarzinom - sowie möglicherweise auch als zukünftigen therapeutischen Angriffspunkt zu eruieren. Entsprechende Studien beim HER2/neu-Subtyp wären zudem sinnvoll.

3. Zusammenfassung der gesamten Arbeit: Deutsch

Das Mammakarzinom ist die häufigste Krebserkrankung der Frau weltweit und stellt noch immer die führende Krebstodesursache der Frau dar, wobei die meisten brustkrebsbedingten Todesfälle im metastasierten Stadium auftreten. Insbesondere zerebrale Metastasen, die vor allem bei den beiden aggressivsten Subtypen, dem Triple-negativen und HER2-Mammakarzinom, auftreten, sind mit einer sehr schlechten Prognose assoziiert. In der komplexen Metastasierungskaskade sind die Ablösung der Tumorzellen aus dem Zellverband und die Invasion in das umgebende Gewebe entscheidend für deren Ausbreitung. Die in den Gefäßen zirkulierenden Tumorzellen, die Circulating Tumor Cells (CTC), kommen als singuläre CTCs sowie in Form von Zellaggregaten, den sogenannten CTC Clustern, vor, wobei letztere mit einem sehr viel höheren Metastasierungsrisiko einhergehen. Die Dysregulation von Adhäsionsproteinen ist dabei ein wesentlicher Schritt in der Tumorgenese und Metastasierung. Besonders den desmosomalen Proteinen, welche die Desmosomen, eine Form des Zell-Zell-Kontaktes bilden, wurden in den letzten Jahren eine bedeutende Rolle in verschiedenen Tumorentitäten zugeschrieben.

Zuvor in unserem Labor durchgeführte Analysen hatten eine signifikant höhere Expression des desmosomalen Proteins Desmocollin-2 (DSC2) in HER2-positivem und Triple-negativem Brustkrebs sowie einen signifikanten Zusammenhang zwischen einer erhöhten DSC2-Expression und dem Auftreten von Hirn- und Lungenmetastasen einerseits und einem reduzierten krankheitsfreien und Gesamt-Überleben andererseits nachgewiesen. Das Ziel dieser experimentellen Arbeit war, die Bedeutung des DSC2 im Mammakarzinom in *in vitro*-Experimenten mit zwei Triple-negativen Zelllinien genauer zu untersuchen. *In vitro* führte eine Hochregulierung von DSC2 in der 3D-Zellkultur zu einer deutlich verstärkten Zellaggregationsfähigkeit und dadurch zu kompakteren und resistenteren Sphäroiden, ein DSC2-Knockdown dagegen über eine verminderte Zellaggregation zu lockeren und leicht dissoziierbaren Sphäroiden. Die kompakten dreidimensionalen Aggregate der DSC2-Überexpression zeigten eine erhöhte Resistenz gegenüber Chemotherapeutika, während bei den 3D-Konstrukten des DSC2-Knockdowns ein gegenteiliger Effekt sichtbar war. Interessanterweise war in den Experimenten der 2D-Zellkultur kein Effekt von DSC2 auf die Chemosensitivität zu beobachten, was umgekehrt verdeutlicht, dass die dreidimensionale Zellaggregation einen Mechanismus zur Reduktion der Diffusion und somit der

Effektivität von Medikamenten darstellt. Zusätzlich hatte eine erhöhte DSC2-Expression keine Auswirkungen auf die Morphologie und Proliferation in der 2D-Zellkultur, war aber assoziiert mit einer verminderten Migrations- und Invasionsfähigkeit. Zusammenfassend konnten wir zeigen, dass eine erhöhte DSC2-Expression in 3D-Zellkulturen beim Triple-negativen Mammakarzinom über eine verstärkte Zellaggregationsfähigkeit zu robusteren Zellclustern mit erhöhter Chemoresistenz führt und damit zu einer vermehrten Bildung und einem verstärkten Überleben von CTC Clustern mit höherem metastatischen Potential. Dies belegt den tumorfördernden Einfluss des DSC2 im Triple-negativen Mammakarzinom.

4. Zusammenfassung der gesamten Arbeit: Englisch

Breast cancer is the most common cancer in women worldwide and is still the leading cause of cancer death in women, with metastatic breast cancer being responsible for a large proportion of breast cancer-related deaths. In particular, cerebral metastases, which occur mainly in the two most aggressive subtypes, triple-negative and HER2 breast carcinoma, are associated with an extremely poor prognosis and a drastic reduction in life expectancy. In the complex metastatic cascade, the detachment of tumour cells from the tumour cell complex and invasion into the surrounding tissue and vessels are essential for their spread. The tumour cells circulating in the vessels, the Circulating Tumour Cells (CTC), occur as singular CTCs as well as in the form of cell aggregates, the so-called CTC clusters, the latter being associated with a much higher risk of metastasis. The dysregulation of adhesion proteins is an essential step in metastasis and tumourigenesis. In particular, desmosomal proteins, which form the desmosomes, a form of cell-cell contact, have been attributed a significant role in various tumour entities in recent years.

Previous analyses performed in our laboratory had demonstrated significantly higher expression of the desmosomal protein desmocollin-2 (DSC2) in HER2-positive and triple-negative breast cancer, as well as a significant association between increased DSC2 expression and the occurrence of brain and lung metastases on the one hand, and reduced recurrence-free and overall survival on the other. The aim of this experimental work was to further investigate the significance of DSC2 in breast carcinoma in *in vitro* experiments with two triple-negative cell lines. *In vitro*, an upregulation of DSC2 in 3D cell culture led to a significantly increased cell aggregation capacity and thus to more compact and resistant spheroids, whereas a DSC2 knockdown led to looser and easily dissociated spheroids via reduced cell aggregation. The compact three-dimensional aggregates of DSC2 overexpression showed increased resistance to chemotherapeutic agents, whereas an opposite effect was visible in the 3D constructs of DSC2 knockdown. Interestingly, no effect of DSC2 on chemosensitivity was observed in the 2D cell culture experiments, illustrating conversely that three-dimensional cell aggregation is a mechanism for reducing diffusion and thus drug efficacy. Additionally, increased DSC2 expression had no effect on morphology and proliferation in 2D cell culture, but was associated with reduced migration and invasion ability. In summary, we demonstrated that increased DSC2 expression in 3D cell cultures in triple-negative breast carcinoma

leads to more robust cell clusters with increased chemoresistance via enhanced cell aggregation capacity, and thus to increased formation and survival of CTC clusters with higher metastatic potential. This proves the tumour-promoting influence of DSC2 in triple-negative breast carcinoma.

5. Literaturverzeichnis

- Aceto, N., Bardia, A., Miyamoto, D. T., Donaldson, M. C., Wittner, B. S., Spencer, J. A., Yu, M., Pely, A., Engstrom, A., Zhu, H., Brannigan, B. W., Kapur, R., Stott, S. L., Shioda, T., Ramaswamy, S., Ting, D. T., Lin, C. P., Toner, M., Haber, D. A., Maheswaran, S. (2014) Circulating tumor cell clusters are oligoclonal precursors of breast cancer metastasis. *Cell*, 158(5):1110-1122.
- Beffagna, G., De Bortoli, M., Nava, A., Salamon, M., Lorenzon, A., Zaccolo, M., Mancuso, L., Sigalotti, L., Baucé, B., Occhi, G., Basso, C., Lanfranchi, G., Towbin, J. A., Thiene, G., Danieli, G. A., Rampazzo, A. (2007) Missense mutations in desmocollin-2 N-terminus, associated with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, affect intracellular localization of desmocollin-2 in vitro. *BMC Med Genet*, 8:65.
- Bidard, F. C., Peeters, D. J., Fehm, T., Nolé, F., Gisbert-Criado, R., Mavroudis, D., Grisanti, S., Generali, D., Garcia-Saenz, J. A., Stebbing, J., Caldas, C., Gazzaniga, P., Manso, L., Zamarchi, R., de Lascoiti, A. F., De Mattos-Arruda, L., Ignatiadis, M., Lebofsky, R., van Laere, S. J., Meier-Stiegen, F., Sandri, M. T., Vidal-Martinez, J., Politaki, E., Consoli, F., Bottini, A., Diaz-Rubio, E., Krell, J., Dawson, S. J., Raimondi, C., Rutten, A., Janni, W., Munzone, E., Carañana, V., Agelaki, S., Almici, C., Dirix, L., Solomayer, E. F., Zorzino, L., Johannes, H., Reis-Filho, J. S., Pantel, K., Pierga, J. Y., Michiels, S. (2014) Clinical validity of circulating tumour cells in patients with metastatic breast cancer: a pooled analysis of individual patient data. *Lancet Oncol*, 15(4):406-14.
- Breslin, S., O'Driscoll, L. (2016) The relevance of using 3D cell cultures, in addition to 2D monolayer cultures, when evaluating breast cancer drug sensitivity and resistance. *Oncotarget*, 7(29):45745-45756.
- Brooke, M. A., Nitouci, D., Kelsell, D. P. (2012) Cell-cell connectivity: desmosomes and disease. *J Pathol*, 226(2):158-71.
- Campenni, M., May, A. N., Boddy, A., Harris, V., Nedelcu, A. M. (2020) Agent-based modelling reveals strategies to reduce the fitness and metastatic potential of circulating tumour cell clusters. *Evol Appl*, 13(7):1635-1650.
- Caswell-Jin, J. L., Plevritis, S. K., Tian, L., Cadham, C. J., Xu, C., Stout, N. K., Sledge, G. W., Mandelblatt, J. S., Kurian, A. W. (2018) Change in Survival in Metastatic Breast Cancer with Treatment Advances: Meta-Analysis and Systematic Review. *JNCI Cancer Spectr*, 2(4):pkv062.
- Chang, P. H., Chen, M. C., Tsai, Y. P., Tan, G. Y. T., Hsu, P. H., Jeng, Y. M., Tsai, Y. F., Yang, M. H., Hwang-Verslues, W. W. (2021) Interplay between desmoglein2 and hypoxia controls metastasis in breast cancer. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 118(3).
- Cheung, K. J., Ewald, A. J. (2016) A collective route to metastasis: Seeding by tumor cell clusters. *Science*, 352(6282):167-9.
- Cheung, K. J., Padmanaban, V., Silvestri, V., Schipper, K., Cohen, J. D., Fairchild, A. N., Gorin, M. A., Verdone, J. E., Pienta, K. J., Bader, J. S., Ewald, A. J. (2016) Polyclonal breast cancer metastases arise from collective dissemination of keratin 14-expressing tumor cell clusters. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 113(7):E854-63.
- Delva, E., Tucker, D. K., Kowalczyk, A. P. (2009) The desmosome. *Cold Spring Harb Perspect Biol*, 1(2):a002543.
- Erdmann, F., Spix, C., Katalinic, A., Christ, M., Folkerts, J., Hansmann, J., Kranzhöfer, K., Kunz, B., Manegold, K., Penzkofer, A., Treml, K., Vollmer, G., Weg-Remers, S., Barnes, B., Buttmann-Schweiger, N., Dahm, S., Fiebig, J., Franke, M., Gurung-Schönfeld, I., Haberland, J., Imhoff, M., Kraywinkel, K., Starker, A., von Berenberg-Gossler, P., Wienecke, A. (2021) Krebs in Deutschland für 2017/2018. 13. Ausgabe. Robert Koch-Institut und die Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V. Berlin: 86-89.

- Fidler, I. J. (2003) The pathogenesis of cancer metastasis: the 'seed and soil' hypothesis revisited. *Nat Rev Cancer*, 3(6):453-8.
- Follain, G., Herrmann, D., Harlepp, S., Hyenne, V., Osmani, N., Warren, S. C., Timpson, P. , Goetz, J. G. (2020) Fluids and their mechanics in tumour transit: shaping metastasis. *Nat Rev Cancer*, 20(2):107-124.
- Garrod, D. , Chidgey, M. (2008) Desmosome structure, composition and function. *Biochim Biophys Acta*, 1778(3):572-87.
- Giuliano, M., Shaikh, A., Lo, H. C., Arpino, G., De Placido, S., Zhang, X. H., Cristofanilli, M., Schiff, R. , Trivedi, M. V. (2018) Perspective on Circulating Tumor Cell Clusters: Why It Takes a Village to Metastasize. *Cancer Research*, 78(4):845.
- Han, H. J., Sung, J. Y., Kim, S. H., Yun, U. J., Kim, H., Jang, E. J., Yoo, H. E., Hong, E. K., Goh, S. H., Moon, A., Lee, J. S., Ye, S. K., Shim, J. , Kim, Y. N. (2021) Fibronectin regulates anoikis resistance via cell aggregate formation. *Cancer Lett*, 508:59-72.
- Hanahan, D. , Weinberg, R. A. (2011) Hallmarks of cancer: the next generation. *Cell*, 144(5):646-74.
- Hapach, L. A., Carey, S. P., Schwager, S. C., Taufalele, P. V., Wang, W., Mosier, J. A., Ortiz-Otero, N., McArdle, T. J., Goldblatt, Z. E., Lampi, M. C., Bordeleau, F., Marshall, J. R., Richardson, I. M., Li, J., King, M. R. , Reinhart-King, C. A. (2021) Phenotypic Heterogeneity and Metastasis of Breast Cancer Cells. *Cancer Res*, 81(13):3649-3663.
- Harrison, O. J., Brasch, J., Lasso, G., Katsamba, P. S., Ahlsen, G., Honig, B. , Shapiro, L. (2016) Structural basis of adhesive binding by desmocollins and desmogleins. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 113(26):7160-5.
- Hegazy, M., Perl, A. L., Svoboda, S. A. , Green, K. J. (2022) Desmosomal Cadherins in Health and Disease. *Annu Rev Pathol*, 17:47-72.
- Hess, K. R., Varadhachary, G. R., Taylor, S. H., Wei, W., Raber, M. N., Lenzi, R. , Abbruzzese, J. L. (2006) Metastatic patterns in adenocarcinoma. *Cancer*, 106(7):1624-33.
- Heuser, A., Plovie, E. R., Ellinor, P. T., Grossmann, K. S., Shin, J. T., Wichter, T., Basson, C. T., Lerman, B. B., Sasse-Klaassen, S., Thierfelder, L., MacRae, C. A. , Gerull, B. (2006) Mutant desmocollin-2 causes arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. *Am J Hum Genet*, 79(6):1081-8.
- Hou, J. M., Krebs, M. G., Lancashire, L., Sloane, R., Backen, A., Swain, R. K., Priest, L. J., Greystoke, A., Zhou, C., Morris, K., Ward, T., Blackhall, F. H. , Dive, C. (2012) Clinical significance and molecular characteristics of circulating tumor cells and circulating tumor microemboli in patients with small-cell lung cancer. *J Clin Oncol*, 30(5):525-32.
- Jiang, F. , Wu, P. (2020) Regulating DSC2 Expression Affects the Proliferation and Apoptosis of Prostate Cancer Cells. *Cancer Manag Res*, 12:11453-11462.
- Johansson, I., Nilsson, C., Berglund, P., Lauss, M., Ringner, M., Olsson, H., Luts, L., Sim, E., Thorstensson, S., Fjallskog, M. L. , Hedenfalk, I. (2012) Gene expression profiling of primary male breast cancers reveals two unique subgroups and identifies N-acetyltransferase-1 (NAT1) as a novel prognostic biomarker. *Breast Cancer Res*, 14(1):R31.
- Katalinic, A., Eisemann, N., Kraywinkel, K., Noftz, M. R. , Hübner, J. (2020) Breast cancer incidence and mortality before and after implementation of the German mammography screening program. *Int J Cancer*, 147(3):709-718.
- Kennecke, H., Yerushalmi, R., Woods, R., Cheang, M. C., Voduc, D., Speers, C. H., Nielsen, T. O. , Gelmon, K. (2010) Metastatic behavior of breast cancer subtypes. *J Clin Oncol*, 28(20):3271-7.

- Kolegraaff, K., Nava, P., Helms, M. N., Parkos, C. A. , Nusrat, A. (2011) Loss of desmocollin-2 confers a tumorigenic phenotype to colonic epithelial cells through activation of Akt/β-catenin signaling. *Mol Biol Cell*, 22(8):1121-34.
- Krol, I., Schwab, F. D., Carbone, R., Ritter, M., Picocci, S., De Marni, M. L., Stepien, G., Franchi, G. M., Zanardi, A., Rissoglio, M. D., Covelli, A., Guidi, G., Scarinci, D., Castro-Giner, F., Mazzarella, L., Doglioni, C., Borghi, F., Milani, P., Kurzeder, C., Weber, W. P. , Aceto, N. (2021) Detection of clustered circulating tumour cells in early breast cancer. *British Journal of Cancer*, 125(1):23-27.
- Laakmann, E., Witzel, I., Fasching, P. A., Rezai, M., Schem, C., Solbach, C., Tesch, H., Klare, P., Schneeweiss, A., Salat, C., Zahm, D.-M., Blohmer, J.-U., Ingold-Heppner, B., Huober, J., Hanusch, C., Jackisch, C., Reinisch, M., Untch, M., von Minckwitz, G., Nekljudova, V., Müller, V. , Loibl, S. (2019) Development of central nervous system metastases as a first site of metastatic disease in breast cancer patients treated in the neoadjuvant trials GeparQuinto and GeparSixto. *Breast Cancer Research*, 21(1):60.
- Lambert, A. W., Pattabiraman, D. R. , Weinberg, R. A. (2017) Emerging Biological Principles of Metastasis. *Cell*, 168(4):670-691.
- Landemaine, T., Jackson, A., Bellahcène, A., Rucci, N., Sin, S., Abad, B. M., Sierra, A., Boudinet, A., Guinebretière, J. M., Ricevuto, E., Noguès, C., Briffod, M., Bièche, I., Cherel, P., Garcia, T., Castronovo, V., Teti, A., Lidereau, R. , Driouch, K. (2008) A six-gene signature predicting breast cancer lung metastasis. *Cancer Res*, 68(15):6092-9.
- Legan, P. K., Yue, K. K., Chidgey, M. A., Holton, J. L., Wilkinson, R. W. , Garrod, D. R. (1994) The bovine desmocollin family: a new gene and expression patterns reflecting epithelial cell proliferation and differentiation. *J Cell Biol*, 126(2):507-18.
- Li, K., Wu, R., Zhou, M., Tong, H. , Luo, K. Q. (2021) Desmosomal proteins of DSC2 and PKP1 promote cancer cells survival and metastasis by increasing cluster formation in circulatory system. *Sci Adv*, 7(40):eabg7265.
- Marrella, A., Fedi, A., Varani, G., Vaccari, I., Fato, M., Firpo, G., Guida, P., Aceto, N. , Scaglione, S. (2021) High blood flow shear stress values are associated with circulating tumor cells cluster disaggregation in a multi-channel microfluidic device. *PLOS ONE*, 16(1):e0245536.
- Massagué, J. , Obenauf, A. C. (2016) Metastatic colonization by circulating tumour cells. *Nature*, 529(7586):298-306.
- Mu, Z., Wang, C., Ye, Z., Austin, L., Civan, J., Hyslop, T., Palazzo, J. P., Jaslow, R., Li, B., Myers, R. E., Jiang, J., Xing, J., Yang, H. , Cristofanilli, M. (2015) Prospective assessment of the prognostic value of circulating tumor cells and their clusters in patients with advanced-stage breast cancer. *Breast Cancer Res Treat*, 154(3):563-71.
- Nguyen, D. X., Bos, P. D. , Massagué, J. (2009) Metastasis: from dissemination to organ-specific colonization. *Nat Rev Cancer*, 9(4):274-84.
- Padmanaban, V., Krol, I., Suhail, Y., Szczerba, B. M., Aceto, N., Bader, J. S. , Ewald, A. J. (2019) E-cadherin is required for metastasis in multiple models of breast cancer. *Nature*, 573(7774):439-444.
- Quigley, M. R., Fukui, O., Chew, B., Bhatia, S. , Karlovits, S. (2013) The shifting landscape of metastatic breast cancer to the CNS. *Neurosurg Rev*, 36(3):377-82.
- Reynolds, D. S., Tevis, K. M., Blessing, W. A., Colson, Y. L., Zaman, M. H. , Grinstaff, M. W. (2017) Breast Cancer Spheroids Reveal a Differential Cancer Stem Cell Response to Chemotherapeutic Treatment. *Sci Rep*, 7(1):10382.
- Saias, L., Gomes, A., Cazales, M., Ducommun, B. , Lobjois, V. (2015) Cell-Cell Adhesion and Cytoskeleton Tension Oppose Each Other in Regulating Tumor Cell Aggregation. *Cancer Res*, 75(12):2426-33.

- Saunus, J. M., Quinn, M. C., Patch, A. M., Pearson, J. V., Bailey, P. J., Nones, K., McCart Reed, A. E., Miller, D., Wilson, P. J., Al-Ejeh, F., Mariasegaram, M., Lau, Q., Withers, T., Jeffree, R. L., Reid, L. E., Da Silva, L., Matsika, A., Niland, C. M., Cummings, M. C., Bruxner, T. J., Christ, A. N., Harliwong, I., Idrisoglu, S., Manning, S., Nourse, C., Nourbakhsh, E., Wani, S., Anderson, M. J., Fink, J. L., Holmes, O., Kazakoff, S., Leonard, C., Newell, F., Taylor, D., Waddell, N., Wood, S., Xu, Q., Kassahn, K. S., Narayanan, V., Taib, N. A., Teo, S. H., Chow, Y. P., kConFab, Jat, P. S., Brandner, S., Flanagan, A. M., Khanna, K. K., Chenevix-Trench, G., Grimmond, S. M., Simpson, P. T., Waddell, N., Lakhani, S. R. (2015) Integrated genomic and transcriptomic analysis of human brain metastases identifies alterations of potential clinical significance. *J Pathol*, 237(3):363-78.
- Schuster, E., Taftaf, R., Reduzzi, C., Albert, M. K., Romero-Calvo, I., Liu, H. (2021) Better together: circulating tumor cell clustering in metastatic cancer. *Trends in Cancer*, 7(11):1020-1032.
- Siegel, R. L., Miller, K. D., Fuchs, H. E., Jemal, A. (2022) Cancer statistics, 2022. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 72(1):7-33.
- Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., Laversanne, M., Soerjomataram, I., Jemal, A., Bray, F. (2021) Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA Cancer J Clin*, 71(3):209-249.
- Wang, C., Mu, Z., Chervoneva, I., Austin, L., Ye, Z., Rossi, G., Palazzo, J. P., Sun, C., Abu-Khalaf, M., Myers, R. E., Zhu, Z., Ba, Y., Li, B., Hou, L., Cristofanilli, M., Yang, H. (2017) Longitudinally collected CTCs and CTC-clusters and clinical outcomes of metastatic breast cancer. *Breast Cancer Res Treat*, 161(1):83-94.
- Waschke, J., Spindler, V. (2014) Desmosomes and Extradesmosomal Adhesive Signaling Contacts in Pemphigus. *34(6)*:1127-1145.
- Wei, S., Siegal, G. P. (2017) Metastatic Organotropism: An Intrinsic Property of Breast Cancer Molecular Subtypes. *Adv Anat Pathol*, 24(2):78-81.

6. Erklärung des Eigenanteils an der Publikation

Die Idee und das Studiendesign dieser Arbeit wurden von Frau Prof. Dr. rer. nat. Leticia Oliveira-Ferrer und Frau Prof. Dr. rer. nat. Christine Stürken auf der Basis der zuvor im gynäkologischen Forschungslabor erhobenen Ergebnisse entwickelt. Sie konzipierten die einzelnen Versuche und betreuten durchgehend die von mir durchgeführten Experimente.

Die Zelllinien MDA-MB231 und MDA-MB231-BR sowie die stabil transfizierten Klone wurden von mir übernommen und kultiviert. Folgende Versuche habe ich eigenständig durchgeführt:

- Proliferationsassay
- Apoptoseassay
- Migrationsassay
- Invasionsassay,
- DSC2-Färbung in der Immunfluoreszenz,
- Generierung der Tumorsphäroide auf Agarose
- Dissoziationsversuche der Tumorsphäroide,
- Generierung der Zellaggregate auf polyHEMA,
- CellTiter-Glo® 3D-Assay
- Chemosensitivitäts-Assay mit polyHEMA-Zellaggregaten
- Auswertung und Quantifizierung der PT-GG- und Histon H2A.X-Färbung.

Die immunhistochemische DSC2-Färbung der auf polyHEMA generierten Zellaggregate wurde im Labor der Anatomie mit meiner Assistenz durchgeführt. Der Färbevorgang der PT-GG- und Histon H2A.X-Färbung wurde ebenfalls in den Laboren der Anatomie durchgeführt.

Zu Beginn wurden der DSC2-Knockdown und die DSC2-Überexpression der transfizierten Klone durch qRT-PCR und Western Blot bestätigt. Anschließend wurden der DSC2-Knockdown und die DSC2-Überexpression mehrfach mittels qRT-PCR durch mich kontrolliert. Des Weiteren habe ich die herunter- beziehungsweise hochregulierte membranöse DSC2-Expression mittels Immunfluoreszenz nachgewiesen. Die DSC2-Überexpression wurde zusätzlich mittels Durchflusszytometrie durch Frau Prof. Dr. rer. nat. Leticia Oliveira-Ferrer bestätigt.

Die statistische Auswertung sowie die graphische Darstellung der durchgeführten Experimente erfolgte durch mich. Die Publikation wurde in Zusammenarbeit mit den Co-Autoren verfasst.

7. Danksagung

Mein ganzer Dank gilt meiner Doktormutter Prof. Dr. Leticia Oliveira-Ferrer , ohne die diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Sie stand immer für Fragen und Diskussionen zur Verfügung und begleitete mich bei jeder Etappe dieses Weges. Auch für die zusätzliche Betreuung durch PD Dr. Christine Stürken, die mir ebenfalls während dieser Zeit zur Seite stand, bin ich sehr dankbar. Ihre Unterstützung und Anmerkungen zu den Experimenten und die stetige Diskussion der Arbeit bereicherten unser Projekt stets.

Auch bedanken möchte ich mich bei Prof. Dr. Schumacher, an den ich mich insbesondere bei den histologischen Zellfärbungen immer wenden konnte.

Sehr dankbar bin ich auch Karen Legeler meinen Dank aussprechen, die mir mit Rat und Tat zur Seite stand.

Maila Rossberg und Kathrin Eylmann aus dem gynäkologischen Forschungslabor wiesen mich in die Zellkultur ein und unterstützten mich während der gesamten Arbeit immer wieder bei der Durchführung der Experimente.

Bei den Cisplatin- und Histon-Färbungen durfte ich auf die tatkräftige Unterstützung durch Jennifer Schröder-Schwarz aus dem Forschungslabor der Anatomie vertrauen. Ebenso dankbar bin ich Anna Kerbs und Maike Märker für ihre Mithilfe insbesondere in den Zellkultur-Experimenten.

Zu guter Letzt konnte ich immer auf den Rückhalt meiner Familie vertrauen, sowohl während der Phase der Experimente als auch während des Schreibens an sich – dafür danke ich Ihnen sehr.

8. Lebenslauf

Persönliche Daten

geboren am 31.10.1995 in Kiel; deutsche Nationalität

Schulausbildung

2001-2005: Grundschule Barkauer Land in Kirchbarkau
2006-2014: Gymnasium Kieler Gelehrtenenschule in Kiel
Juli 2014: Abitur (Notendurchschnitt: 1,0)

Studium

Seit WS 2014/15: Medizinstudium an der Universität Hamburg
Seit 2016: Erhalt des Deutschlandstipendiums (privater Förderer: UKE-Freundes- und Förderkreis)
2016: Aufnahme in das „Mentoringprogramm für exzellente Studierende“
März 2017: Erwerb der Physikumsäquivalenzprüfung (Note 1)
Oktober 2018: Beginn der Dissertation in der Klinik und Poliklinik für Gynäkologie bei Frau Prof. Dr. rer. nat. Leticia Oliveira-Ferrer sowie dem Institut für Anatomie und Experimentelle Morphologie bei Herrn Prof. Dr. med. Udo Schumacher am UKE
März 2019: Teilnahme am Studentenforum des 136. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie in München
Oktober 2020: 2. Abschnitt der ärztlichen Prüfung
November 2020 - Praktisches Jahr:
Oktober 2021: 1. Tertial in der Chirurgie am Universitätsklinikum Augsburg
2. Tertial in der Inneren Medizin am Israelitischen Krankenhaus in Hamburg
3. Tertial in der Gynäkologie am Städtischen Klinikum Lüneburg
Dezember 2021: 3. Abschnitt der ärztlichen Prüfung (Note: sehr gut)
Juli 2022: Assistenzärztin in der Inneren Medizin der Schön-Klinik Eilbek
Seit Juli 2023: Assistenzärztin in der Allgemein- und Viszeralchirurgie des Universitätsklinikums Freiburg

9. Eidesstattliche Versicherung

Ich versichere ausdrücklich, dass ich die Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die von mir angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die aus den benutzten Werken wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen einzeln nach Ausgabe (Auflage und Jahr des Erscheinens), Band und Seite des benutzten Werkes kenntlich gemacht habe.

Ferner versichere ich, dass ich die Dissertation bisher nicht einem Fachvertreter an einer anderen Hochschule zur Überprüfung vorgelegt oder mich anderweitig um Zulassung zur Promotion beworben habe.

Ich erkläre mich einverstanden, dass meine Dissertation vom Dekanat der Medizinischen Fakultät mit einer gängigen Software zur Erkennung von Plagiaten überprüft werden kann.

Unterschrift: