



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
51		030/010 Extrapyramidale motorische Erkrankungen Parkinson Syndrom	10/2005-10/2007 TO	#			Medikamentöse Ersttherapieempfehlung bei über 70 und unter 70 Jährigen; Therapie sollte altersgerecht sein	><70 Jahre	D2,E1	Therapie mit speziellen Dopamin Agonisten; (s. Screening Doc.)	Therapieempfehlung auch für Multimorbide geltend					04.05.2008
52							Therapie sollte altersgerecht erfolgen	unspez. Alter	B,D2							
53							Prävalenz bei geriatrischen Pat.	1800/100000	B,C							
54		030/067 Diagnostik bei Polyneuropathie	2/2005-2/2010	#			Bei nebenbefundlich erhobener PNP richtet sich weitere Diagnostik nach Ausmaß und Schwere	k.A.	B,D1							04.05.2008
55		030/062 Rehabilitation, motorisch nach Schlaganfall	9/2005-9/2010	#			Reha indiziert bei älteren Patienten	über 75 J.	D2,E1	Durchführung von Reha						04.05.2008
56		030/081 Restless Leg Syndrom (RLS) und Periodic Limb Movement PLM	2/2005-2/2010	#			PLM im Alter zunehmend	30% der über 50 J.	C,E3							04.05.2008
57		030/047 Schädel Hirn Trauma, leichtes	10/2005-10/2010	#			CCT bei älteren Pat.	über 65 Jahren	D1,E1	Notfall CCT bei leichten Schädel Hirn Trauma		keine genaue Studienzuordnung möglich				04.05.2008
58							Stationäre Akutbetreuung bei Pat. über 65 J.	über 65 Jahren	D2,E1	Stationäre Betreuung bei Risikopatienten						04.05.2008
59		030/096 Schwindel	9/2005-9/2010	#			Vestibularisparoxysmie und M. Meniere	Beginn zw. 50. und 70. Lj.	C,E3							04.05.2008
60		030/077 Therapie des episodischen und des chr. Spannungskopfschmerzes und anderer chr. täglicher Kopfschmerzen	12/2004-12/2009	#			Prävalenzgipfel des Spannungskopfschmerzes im höheren Alter	über 64. Lj.	C,E2			Spierings et al. 2000				04.05.2008
61		030/080 Stiff man- Syndrom	10/2005-10/2010	#			Erkrankungsalter Zeitspanne	13-81 Jahre	C,E3							04.05.2008
62		030/073 Subarachnoidalblutung	10/2005-10/2010	#			SAB Häufigkeit	5. und 6. Lebensdekade	C,E3							04.05.2008
63							Prognostischer Faktor	unspez. Alter	B,H			Broderick et al. 1994				
64		030/104 Tetanus	10/2005-10/2010	#			Tetanus zu entwickeln im Alter sieben mal höher	bei über 60 Jährigen	C,E2							04.05.2008
65		030/083 Transiente globale Amnesie	10/2005-10/2010	#			Attacken zu 75% im höheren Lebensalter	70. Lj.	C,E1			Broderick et al. 1994				04.05.2008
66		030/011 Tremor	10/2005-10/2010	#			Möglicher Erkrankungsbeginn im Alter	unspez. Alter	B,C							04.05.2008
67																
68	032	<b>Onkologie</b>														
69		032/047 Diagnostik und Therapie zerebraler Metastasen	10/2004-10/2009	#			Entscheidung über Therapie einer Metastase abhängig von Alter	unspez. Alter	B,D2							04.05.2008
70							Indikation zu Ganzhirnbestrahlung bei solitärer Metastase	Pat. über 70.Lj.	D2,E1	Primär palliative WBRT						
71							Prognosefaktor für neurochirurgische Therapie	unspez. Alter	B,D2,H			Sawaya et al. 1994, Nussbaum et al 1996, Wronski et al.1996, Sampson et al. 1998, Lagerwaard et al. (1999)				
72																
73	033	<b>Orthopädie</b>														
74		1. Alter als Indikationskriterium für OP	033/001 Koxarthrose	4/2002-2/2008 TO	#		Primäre idiopathische Koxarthrose klinische Manifestation	nach 50.-60.Lj.	C,E3							12.05.2008
75		2. Stufenschemata, therapeutisches Vorgehen abhängig vom Alter					Endoprothetischer Ersatz vorwiegend für ältere Pat. bei schwerer Koxarthrose	unspez. Alter	B,D2	Endoprothetischer Ersatz						
76																
77			033/002 Hüftkopfnekrose	4/002-1/2008 TO	#		1,2	unspez. Alter	B,D2							12.05.2008
78																
79			033/004 Gonarthrose	4/2002-1/2008 TO	#		Hohe Prävalenz der Gonarthrose bei über 60 Jährigen	60 Jährigen	C,E2							12.05.2008
80																
81							1,2	unspez. Alter	B,D2							
82			033/006 Meniskuserkrankungen	4/2002-1/2008 TO	#		Durch Mikrotraumata und Alterungsvorgänge verursacht; 1,2	k.A.	B,D2							12.05.2008
83																
84			033/008 Frische und alte Kreuzbandfraktur	4/2002-1/2008 TO	#		1,2	k.A.	B,D2							12.05.2008
85																
86			033/009 Mediale Schenkelhalsfraktur	4/2002-1/2008 TO	#		Durch verminderte Belastbarkeit des prox. Femur im höheren Alter; Demographische Aussage: zunehmende Relevanz durch Altersentwicklung 1,2	unspez. Alter	B,D2							12.05.2008
87							Endoprothetischer Ersatz hauptsächlich bei älteren Pat. mit avitalem Hüftkopf	unspez. Alter	B,D2	Endoprothetischer Ersatz						
88																
89			033/010 Malleolarfraktur	4/2002-1/2008 TO	#		1,2	unspez. Alter	B,D2							12.05.2008
90																
91			033/012 Patellasehnenfraktur	4/2002-1/2008 TO	#		1,2	unspez. Alter	B,D2							12.05.2008
92																
93			033/013 Patellalux.	4/2001-1/2008 TO	#		1,2	unspez. Alter	B,D2							12.05.2008
94																
95			033/014 Infizierte Gelenk	4/2001-1/2008 TO	#		1	unspez. Alter	B,D2							12.05.2008
96																
97		Folgende LLs nur mit 1, 2	033/016 Knochenmetastasen (1); 033/018 Halux valgus (1,2); 033/023 Frische Außenbandruptur des OSG (1,2); 033/024 Osteochondrosis dissecans des Kniegelenks (1,2); 033/027 Schulterluxation, rezidivierend, habituell (1,2); 033/028 Spondylolisthesis (1,2); 033/029 Scaphoidfraktur (1,2); 033/030Scaphoidpseudarthrose (1,2)	4/2001-1/2008 TO	#		1,2	unspez. Alter	B,D2							12.05.2008
98																
99			033/031 Pterochantäre Fraktur des Femur	4/2002-1/2008 TO	#		Fraktur bevorzugt im höheren Lebensalter und bei weiblichen Geschlecht	unspez. Alter	B,C							12.05.2008
100							1,2		B,D2							
101			033/034 Diagnostik muskuloskelettaler Malignome	4/2002-1/2008 TO	#		Epidemiologie der Weichteilsarkome Häufiger bei Männern als Frauen	Altersgipfel im 6. Dezenium	C,E2			Dahlin 1978, Schajowicz 1994, Freyschmidt et al. 1998 Lawrence et al. 1983; Meister u. Hölzel 1999				12.05.2008
102																
103			033/035 Weichteilsarkome > Prognose	4/2002-1/2008 TO	#		Prognose:Ungünstige Prognose im hohen Alter	unspez. Alter	B,H							01.06.2008
104																
105			033/042 Solitäres und multiples Myelom	12/2003-12/2008	#		Chemotherapie im höheren Alter	über 65 J.	D2,E1	Anwendung spezifischer Chemotherapieschemata						12.05.2008
106																
107			033/041 Rotatorenmanschettenruptur	12/2003-12/2008	#		Ruptur durch alterungs- und anlagebedingte Veränderungen	k.A.	B (Aussage nicht gezählt)							12.05.2008
108																
109			033/044 Reha und Amputation an der unteren Extremität	7/2005-7/2008	#		Prognostische Aussage für ältere Pat. Nach Reha; auch abh. vom biologischen Alter	unspez. Alter	B,H	Schlechtere Prognose bei älteren Pat. nach Amputation des Kniegelenks bezüglich der Reha						12.05.2008

